

Mag ik met de auto rijden?

Omwille van mogelijke slaperigheid is het niet aangewezen een voertuig te besturen of machines te bedienen.

Na enkele weken kan uw arts oordelen of bepaalde handelingen wel kunnen.

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Neen, nu je je beter voelt, mag je niet plots stoppen. Als je dat doet zullen je klachten zeker terug de kop opsteken. Je zal je paliperidone een lange tijd moeten blijven innemen, soms gedurende jaren. Dit is niet schadelijk omdat je geneesmiddel geen verslaving veroorzaakt.

Pletten?

Paliperidone moet in zijn geheel ingeslikt worden, zonder er op te kauwen. Zeker niet pletten of breken.

Generieken

Geen generiek beschikbaar.

Allergie-informatie

Je mag dit geneesmiddel niet gebruiken als je allergisch bent voor risperidon. Invega 3 mg bevat lactose.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers



Patiëntenfolder nr. 18



VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
De Pintelaan 185
9000 Gent
09 332 29 77
www.vza.be
secretariaat@vza.be

**2DE GENERATIE
ANTIPSYCHOTICA:
PALIPERIDONE**

Waarom werd mij paliperidone voorgeschreven?

Sommige mensen lijden aan een psychotische stoornis (oa schizofrenie), stoornissen waarbij oa het denken en voelen gestoord zijn. Dit kan gepaard gaan met waanvoorstellingen, zinsbegoochelingen en innerlijke onrust.

Antipsychotische geneesmiddelen kunnen helpen om deze symptomen te onderdrukken, alhoewel het soms niet helemaal lukt. De vroegere (klassieke) antipsychotica gaven dikwijls aanleiding tot "beven" en het maken van vreemde bewegingen. De recentere (atypische) antipsychotica hebben dit soort bijwerkingen veel minder.

Wat is paliperidone?

Paliperidone is een "atypisch" antipsychoticum, het werkt anders dan de "klassieke" antipsychotica en vertoont andere bijwerkingen. Paliperidone geneest je ziekte niet, maar zal je veel beter doen voelen.

Paliperidone is de naam van de werkzame stof, het geneesmiddel zelf heet Invega®.

Paliperidone is ook beschikbaar onder de vorm van een injectie, deze heet Xeplion®.

Momenteel neem jij:

Is paliperidone veilig?

Paliperidone is veilig als je je houdt aan wat je arts je voorschrijft.

Licht daarom steeds je arts in:

- wanneer je lijdt aan epilepsie of aan de ziekte van Parkinson of indien je problemen hebt met je hart, lever of nieren;
- over welke geneesmiddelen jij op dit ogenblik inneemt (ook die zonder voorschrift);
- of je zwanger bent of het wenst te worden;
- als je borstvoeding wenst te geven.

Hoe moet ik mijn paliperidone innemen?

Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis.

Paliperidone moet 's ochtends ingenomen worden,

met of zonder voedsel, maar steeds op dezelfde wijze. Slik de tablet in zijn geheel in met wat vloeistof, zonder erop te kauwen.

De tabletten mogen niet gedeeld of geplet worden.

Maak je geen zorgen als je in je ontlasting iets opmerkt dat eruit ziet als een tablet, dit is het leeg omhulsel van de tablet, de werkzame stof werd wel vrijgesteld.

Indien je zou vergeten om je paliperidone in te nemen, dan kan je dit nog tot 's middags inhalen, maar neem nooit een dubbele dosis in.

Wat voel ik na de inname van mijn paliperidone?

Reeds na enkele dagen zal je je rustiger en minder gespannen voelen. Ongewone gedachten of stemmen zullen geleidelijk verdwijnen. Je kan stilaan weer helder denken, dikwijls reeds na enkele weken.

Geef je geneesmiddel de tijd om te werken.

Zijn er bijwerkingen met paliperidone?

In het begin kan je toch enkele bijwerkingen ervaren. Deze zijn meestal niet ernstig en ze verdwijnen meestal na enkele weken.

Raadplaag onderstaande tabel om te weten hoe je best reageert. Let wel, niet iedereen heeft er last van.

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
Orthostatische hypotensie	Lage bloeddruk, vnl. bij plots rechtstaan.	Tracht langzaam recht te komen. Vermijd het besturen van voertuigen en machines.
Somnolentie	Slaperigheid, verminderde waakzaamheid	Indien storend: spreek erover met je arts.
Droge mond		Indien dit storend is, spreek erover met je arts.
Parkinsonisme	Oa speekselvloed, rusteloosheid, schokkerige bewegingen, trillen,...	Spreek erover met je arts.
Metabole stoornissen	Veranderde bloedwaarden (glycemie, HDL, LDL, enz.)	Je arts zal deze parameters opvolgen.
Andere bijwerkingen		Laat niet na deze te bespreken met je arts.

Mag ik alcohol drinken?

In het begin van je behandeling is dit af te raden. De kans is namelijk zeer groot dat je erg slaperig wordt.

Na enkele weken mag je met mate drinken. Vergeet echter niet je geneesmiddel in te nemen!