
Mag ik met de auto rijden?

Rij de eerste paar dagen van je behandeling niet met de wagen!

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Neen, nu je je beter voelt, mag je niet plots stoppen. Als je dat doet zullen je klachten zeker terug de kop opsteken. Je zal je risperidone een lange tijd moeten blijven innemen, soms gedurende jaren. Dit is niet schadelijk omdat je geneesmiddel geen verslaving veroorzaakt.

Pletten?

De tabletten mogen geplet worden. De smelttabletten kunnen gesuspendeerd worden. Alternatief: druppelvorm.

Generieken

Risperidone bestaat onder verschillende generieken.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers



Patiëntenfolder nr. 20



VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
De Pintelaan 185
9000 Gent
09 332 29 77
www.vza.be
secretariaat@vza.be

**ATYPISCHE
ANTIPSYCHOTICA:
RISPERIDONE**

Waarom werd mij risperidone voorgeschreven?

Veel mensen lijden aan een psychotische stoornis of aan een stoornis in het denken en voelen. Dit kan gepaard gaan met waanvoorstellingen, zinsbegoochelingen en innerlijke onrust. Gewone antipsychotische geneesmiddelen helpen meestal bij deze ziekte, maar soms lukt dat niet helemaal. Je voelt je nog steeds moe en je hebt een gebrek aan energie en motivatie. Gewone antipsychotica kunnen je ook doen "beven" of andere vreemde bewegingen doen maken. Dit kan zo erg worden dat men je behandeling moet stopzetten.

Risperidone kan je helpen wanneer je je niet echt beter voelt met de gewone antipsychotica of indien je veel last hebt van bijwerkingen.

Wat is risperidone?

Risperidone is een atypisch antipsychoticum. Het werkt anders dan de gewone antipsychotica en heeft andere bijwerkingen. Het werkt goed bij mensen die veel last hebben van bijwerkingen van de gewone antipsychotica of die symptomen vertonen die lijken op depressie. Risperidone geneest je ziekte niet, maar het zal je je veel beter doen voelen.

Momenteel neem jij:

Is risperidone veilig?

Risperidone is veilig als je je houdt aan wat je arts je voorschrijft.

Licht steeds je arts in:

- wanneer je lijdt aan epilepsie of aan de ziekte van Parkinson, of dementie, of indien je problemen hebt met je hart, vaten (bloedstolsels), bloeddruk, lever of nieren;
- wanneer je in het verleden weinig witte bloedcellen hebt gehad
- wanneer je suikerziekte hebt
- wanneer je een te hoog gehalte aan prolactine in je bloed hebt
- over welke geneesmiddelen jij op het ogenblik inneemt;
- of je zwanger bent of het wenst te worden;

- als je borstvoeding wenst te geven. Je hebt een doktersvoorschrift nodig wanneer je risperidone afhaalt bij je apotheker.

Bewaar je geneesmiddel buiten bereik van kinderen en geef het niet door aan anderen.

Hoe moet ik mijn risperidone innemen?

Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis en volg de richtlijnen van je arts goed op. Neem je geneesmiddel steeds in met een glas water. Indien je zou vergeten om je risperidone in te nemen, dan kan je dit nog na enkele uren inhalen, maar neem geen dubbele dosis.

Wat voel ik na de inname van mijn risperidone?

Enkele dagen na de eerste inname zal je je al rustiger en minder gespannen voelen. Alhoewel je nog stemmen kan horen of ongewone dingen kan zien, zal je ze beter verwerken. Je kan stilaan weer helder denken en ongewone gedachten zullen geleidelijk verdwijnen. De meeste mensen voelen zich beter na enkele weken. Geef je geneesmiddel de tijd om te werken!

Zijn er bijwerkingen met risperidone?

De eerste weken kan je bijwerkingen ondervinden voor je je beter begint te voelen. De klachten zijn meestal niet ernstig en ze verdwijnen na enkele weken. Raadpleeg onderstaande tabel om te weten wat je moet doen als je één van de bijwerkingen ondervindt. Let wel, niet iedereen heeft daar last van.

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
Hypotensie	Lage bloeddruk: je kan je duizelig voelen.	Tracht langzaam recht te komen. Bestuur geen voertuig.
Hoofdpijn		Vraag je apotheker om een middel op basis van paracetamol.
Rusteloosheid	Je voelt je opgewonden. Je kan meer zweten.	Indien dit storend is, spreek erover met je arts.
Metabole stoornissen	Veranderde bloedwaarden (glycemie, HDL, LDL, enz.)	Je arts zal deze parameters opvolgen.
Andere bijwerkingen		Indien je nog een andere bijwerking zou voelen, bespreek dit dan met je arts.
Gewichtstoename	Lichaamsgewicht stijgt	eet veel groenten en vezelrijke voeding, voldoende lichaamsbeweging

Mag ik alcohol drinken?

In het begin van je behandeling met risperidone mag je geen alcohol drinken. De kans is namelijk zeer groot dat je erg slaperig wordt. Na enkele weken mag je met mate drinken. Laat in geen geval na je geneesmiddel in te nemen.

Tijdens je behandeling met risperidone gebruik je best geen alcohol. De kans is namelijk groot dat je erg slaperig wordt. Laat in geen geval na je geneesmiddel in te nemen.