

Mag ik alcohol drinken?

In het begin van je behandeling met Risperdal Consta mag je geen alcohol drinken. De kans is namelijk zeer groot dat je erg slaperig wordt. Na een tweetal maanden mag je met mate drinken.

Tijdens je behandeling met Risperdal Consta gebruik je best geen alcohol. De kans is namelijk groot dat je erg slaperig wordt. Laat in geen geval na je geneesmiddel in te nemen.

Mag ik met de auto rijden?

Bestuur geen voertuig zolang je individuele gevoeligheid niet bekend is. Risperdal Consta kan namelijk je waakzaamheid beïnvloeden. Raadpleeg bij twijfel je arts.

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Neen, nu je je beter voelt, mag je zeker niet stoppen. Als je dat doet zullen je klachten terug verschijnen.

Je zal je Risperdal Consta gedurende lange tijd toegediend moeten krijgen, meestal jaren. Dit is niet schadelijk omdat het geneesmiddel geen verslaving veroorzaakt.

Indien je toch stopt met de behandeling, hou er dan rekening mee dat het zes weken duurt vooraleer je laatste inspuiting uitgewerkt is.

Generieken

Geen generiek op de markt.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers



Patiëntenfolder nr. 21



VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
De Pintelaan 185
9000 Gent
09 332 29 77
www.vza.be
secretariaat@vza.be

**ATYPISCHE
ANTIPSYCHOTICA:
RISPERDAL CONSTA®**

Waarom werd mij Risperdal Consta voorgeschreven?

Veel mensen lijden aan een psychotische stoornis of aan een stoornis in het denken en voelen. Dit kan gepaard gaan met waanvoorstellingen, zinsbegoochelingen en innerlijke onrust. Gewone antipsychotica helpen hierbij meestal, maar soms lukt dat niet helemaal. Je voelt je nog steeds moe en je hebt een gebrek aan energie en motivatie. Gewone antipsychotica kunnen je ook doen "beven" of andere vreemde bewegingen laten maken. Dat kan zo erg worden dat men je behandeling moet stopzetten.

Risperdal Consta kan je helpen wanneer je je niet echt beter voelt met de gewone antipsychotica, je veel last hebt van bijwerkingen of je problemen ervaart bij het volgen van je therapie. Ook als je problemen hebt met het regelmatig innemen van je medicatie is Risperdal Consta aangewezen.

Wat is Risperdal Consta?

Risperdal Consta is een langwerkende, inspuitbare vorm van risperidone.

Risperdal Consta werkt anders dan de gewone antipsychotica. Je voelt je geestelijk beter en je bent minder geremd in bewegen en denken.

Risperidone geneest je ziekte niet, maar je zal je er veel beter door voelen.

Risperdal Consta zorgt er voor dat je geneesmiddel elke dag even krachtig werkt.

Is Risperdal Consta veilig?

Risperdal Consta is veilig als je het voorschrift van je arts goed opvolgt.

Je hebt een doktersvoorschrift nodig als je Risperdal Consta wilt halen bij de apotheker.

Bewaar je inspuiting steeds in de koelkast ! (2-8°C)

Indien ze langer dan 1 uur op hogere temperatuur bewaard is geweest (doch niet hoger dan 25°C), moet ze binnen de 7 dagen gebruikt worden.

Hoe wordt mij Risperdal Consta toegediend?

Eerst moet je al enige tijd met een antipsychoticum per os behandeld geweest zijn, pas dan kan gestart worden met Risperdal Consta.

Deze orale behandeling wordt meestal gestopt drie weken na de eerste injectie met Risperdal Consta. Hou je daarom strikt aan de richtlijnen van je arts.

Risperdal Consta wordt diep in je bil- of armspier toegediend. De inspuiting moet om de twee weken herhaald worden, telkens in je andere bil of arm.

Wat voel ik na de toediening van Risperdal Consta?

Zoals bij elke inspuiting kan je enige tijd een lichte irritatie ondervinden.

Pas drie weken na de eerste toediening werkt het geneesmiddel volop. Je zal je rustiger en minder gespannen voelen.

Hoewel je nog stemmen kan horen of ongewone dingen kan zien, zal je ze beter verwerken. Let wel, dit kan verschillende weken duren.

Geef je geneesmiddel de tijd om te werken!

Soms kan een dosisaanpassing noodzakelijk zijn. Dit kan echter pas ten vroegste na 4 weken.

Zijn er bijwerkingen met Risperdal Consta?

De eerste weken kan je bijwerkingen ondervinden.

De klachten zijn meestal niet ernstig en verdwijnen dikwijls spontaan.

Bekijk de volgende tabel om te weten wat je moet doen als je één van deze bijwerkingen ondervindt.

Let wel, niet iedereen heeft er last van !

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
Hypotensie	Lage bloeddruk: je kan je duizelig voelen.	Tracht langzaam recht te komen. Bestuur geen voertuig.
Hoofdpijn		Vraag je apotheker om een middel op basis van paracetamol.
Rusteloosheid	Je voelt je opgewonden. Je kan meer zweten.	Indien dit storend is, spreek erover met je arts.
Gewichtstoename	Lichaamsgewicht stijgt.	Eet veel groenten en vezelrijke voeding. Voldoende lichaamsbeweging.
Depressie	Je voelt je lusteloos.	Spreek erover met je arts.
Verhoogde prolactine	Kan een storend effect hebben op de maandstonden bij vrouwen en op de potentie bij mannen	Meestal niet verontwaardigend. Spreek hierover met je arts.
Metabole stoornissen	Veranderde bloedwaarde (glycemie, HDL, LDL, enz.)	Je arts zal deze parameters opvolgen.
Andere bijwerkingen		Indien je nog een andere bijwerking zou voelen, bespreek dit dan met je arts.