

Mag ik alcohol drinken?

In het begin van je behandeling mag je geen alcohol drinken. De kans op problemen met je bloeddruk zijn dan groter. Na enkele weken, als de therapeutische dosis bereikt is, mag je met mate drinken. Vergeet echter niet je geneesmiddel in te nemen.

Mag ik met de auto rijden?

Hoewel sertindol niet slaapverwekkend is, is het toch niet aan te raden een voertuig te besturen of machines te bedienen tot je individuele gevoeligheid aan de medicatie bekend is. Bespreek dit met je arts.

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Neen, stop zeker niet op eigen initiatief. Na een onderbreking van meer dan een week is het wenselijk opnieuw met de laagste dosis te starten. Raadpleeg uw arts!

Pletten?

Sertindol mag geplet worden.

Generieken

Geen generiek.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers



Patiëntenfolder nr. 22



VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
De Pintelaan 185
9000 Gent
09 332 29 77
www.vza.be
secretariaat@vza.be

SERTINDOL

Waarom werd mij sertindol voorgeschreven?

Heel wat mensen lijden aan schizofrenie of aan een stoornis in het denken en voelen. Dit kan gepaard gaan met waanvoorstellingen en innerlijke onrust.

Gewone antipsychotica helpen meestal bij deze ziekte, maar soms lukt dat niet helemaal. Je blijft je moe voelen of hebt een gebrek aan energie en motivatie. Bovendien kunnen gewone 'antipsychotica' je ook doen beven, of andere vreemde bewegingen laten maken. Dat kan zo erg worden dat men je behandeling moet stopzetten.

Als je ten minste één ander antipsychoticum niet verdraagt kan je arts kiezen voor sertindol.

Wat is sertindol?

Sertindol is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van schizofrenie. Het behoort tot de atypische antipsychotica. Het heeft een remmend effect op bepaalde zenuwcellen in de hersenen.

Momenteel neem jij:

Is sertindol veilig?

Sertindol is veilig als je de richtlijnen van je arts opvolgt. Uit studies is namelijk gebleken dat sertindol de hartgeleiding kan beïnvloeden. Daarom zal je arts vóór het opstarten van de behandeling, en telkens vóór en na een dosisverhoging, een electrocardiogram afnemen. Bovendien is het wenselijk dit alle 3 maanden te herhalen. Ook bij aanpassingen aan de dosering van andere geneesmiddelen die een effect kunnen hebben op het sertindolgehalte in het bloed, zal een electrocardiogram afgenomen worden. Soms is het ook noodzakelijk het kalium- en magnesiumgehalte in je bloed te bepalen voor het starten van je behandeling. Licht daarom steeds je arts in:

- Als je lijdt aan een hart- of vaataandoening;
- Wanneer je leverproblemen hebt;
- Als je hartgeleidingsstoornissen hebt;
- Over welke geneesmiddelen je momenteel neemt;
- Als je zwanger bent of het wenst te worden;
- Als je borstvoeding wenst te geven.

Een doktersvoorschrift is noodzakelijk als je sertindol wilt halen bij je apotheker. Je zal ook een attest nodig hebben om sertindol terugbetaald te krijgen.

Bewaar je geneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking (beschermd tegen licht) buiten het bereik van kinderen. Geef het nooit aan iemand anders!

Hoe moet ik mijn sertindol innemen?

Na de vereiste onderzoeken kan je starten met een dosis van 4 mg 1xdaags tijdens of na de maaltijd met een glas water. Verhogen van de dosis kan in stappen van 4 mg om de 4 à 5 dagen tot een maximale dosis van 20 mg (of uitzonderlijk 24 mg), afhankelijk van de respons. Neem altijd alles in één keer in. Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis. Indien je zou vergeten om je sertindol in te nemen, neem dan later zeker geen dubbele dosis.

Wat voel ik na de inname van mijn sertindol?

Na enige tijd zal je rustiger en minder gespannen worden. Hoewel je nog stemmen kan horen of ongewone dingen kan zien, zal je er beter mee kunnen omgaan. De meeste mensen voelen zich beter na enkele weken. Geef je geneesmiddel de tijd om te werken!

Zijn er bijwerkingen met sertindol?

In het begin van je behandeling kan je bijwerkingen ondervinden. Deze zijn meestal niet ernstig en verdwijnen na enige tijd. Bekijk de volgende tabel om te weten wat je moet doen. Let wel, niet iedereen heeft er last van!

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
Rhinitis	Neusloop en/of verstopte neus.	Indien te hinderlijk: gebruik tijdelijk een neusspray.
Orthostatische hypotensie	Lage bloeddruk	<ul style="list-style-type: none">• Sta langzaam recht.• Vermijd het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.
Duizeligheid		Contacteer je arts indien dit lang duurt.
Droge mond		Zuig op een suikervrije snoep.
Abnormale ejaculatie	Verstoorde zaadlozing	Spreek erover met je arts.
Perifeer oedeem	Zwellen van handen of voeten	Spreek erover met je arts.
Kotademigheid		Spreek erover met je arts.
Gewichtstoename	Je hebt meer eetlust en je gewicht neemt toe, voorla tijdens de eerste weken van inname.	Eet veel groenten en vezels.
Andere bijwerkingen		Indien je nog een andere bijwerking zou voelen, bespreek dit dan met je arts of apotheker.