

Mag ik met de auto rijden?

Het is verboden een voertuig te besturen of machines te bedienen voor de rest van de dag telkens je een inspuiting gekregen hebt (om de 2 of 4 weken).

Zorg dus steeds voor begeleiding of vervoer wanneer je je inspuiting laat toedienen.

De dag erna is autorijden wel toegestaan van zodra de slaperigheid verdwenen is.

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Neen, nu je je beter voelt mag je je behandeling niet stoppen. Het risico dat je klachten terug de kop opsteken is te groot. Je zal je therapie lange tijd moeten blijven volgen, soms vele jaren. Dit is niet schadelijk je geneesmiddel veroorzaakt geen verslaving.

Generieken

Geen generiek.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers



Patiëntenfolder nr. 23



VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
De Pintelaan 185
9000 Gent
09 332 29 77
www.vza.be
secretariaat@vza.be

**ATYPISCHE
ANTIPSYCHOTICA:
OLANZAPINE
(ZYPADHERA®)**

Waarom werd mij ZypAdhera voorgeschreven?

Veel mensen lijden aan schizofrenie of aan een stoornis in het denken en voelen. Dit kan gepaard gaan met waanvoorstellingen, zinsbegoochelingen en innerlijke onrust. Gewone antipsychotica helpen hierbij meestal, maar ook niet altijd. Je voelt je nog steeds moe en je hebt een gebrek aan energie en motivatie. Gewone antipsychotica kunnen je ook doen "beven" of andere vreemde bewegingen laten maken. Dat kan zo erg worden dat men je behandeling moet stopzetten.

Zypadhera kan je helpen wanneer je je niet echt beter voelt met de gewone antipsychotica je veel last hebt van bijwerkingen of je problemen ervaart bij het volgen van je therapie.

Wat is ZypAdhera?

ZypAdhera is een langwerkende, inspuitbare vorm van olanzapine.

Zypadhera werkt anders dan de gewone(de oudere) antipsychotica en helpt goed bij mensen die veel last hebben van de bijwerkingen hiervan of symptomen vertonen die lijken op depressie.

ZypAdhera geneest je ziekte niet, maar je zal je veel beter voelen.

Is ZypAdhera veilig?

ZypAdhera is veilig als je het voorschrift van je arts goed opvolgt.

Licht je arts steeds in:

- wanneer je lijdt aan epilepsie of aan de ziekte van Parkinson, of indien je problemen hebt met je hart, lever of nieren.
- wanneer je lijdt aan een oogziekte.
- over welke geneesmiddelen jij op het ogenblik inneemt (ook die zonder doktersvoorschrift).
- of je zwanger bent of het wenst te worden.
- als je borstvoeding wenst te geven.

Je hebt een doktersvoorschrift nodig als je ZypAdhera wilt halen bij de apotheker.

Hoe wordt mij ZypAdhera toegediend?

Eerst moet je enige tijd olanzapine tabletten innemen. Pas als je dit verdraagt kan er overgeschakeld worden op de inspuiting. In het begin om de 2 weken, later eventueel om de 4 weken (afhankelijk van de gewenste onderhoudsdosis).

ZypAdhera moet verplicht toegediend worden in een zorginstelling waar observatie tot minstens 3 uur na de injectie gewaarborgd is.

De inspuiting zal u toegediend worden door een arts of verpleegkundige die geoefend is in de juiste injectietechniek.

Na de toediening mag u niet alleen gaan naar uw bestemming. Zorg dus steeds voor begeleiding.

Wat voel ik na de toediening van ZypAdhera?

Zoals bij elke inspuiting kan je enige tijd wat pijn, een lichte zwelling of een andere irritatie ervaren ter hoogte van de injectieplaats

Heel snel zal je je ook rustiger en minder gespannen voelen. Hoewel je nog stemmen kunt horen of ongewone dingen kunt zien, zal je ze beter verwerken. Je begint meer helder te denken en ongewone gedachten zullen geleidelijk verdwijnen. Depressieve gevoelens of vermoeidheid zullen eveneens verbeteren.

Geef je geneesmiddel de tijd om te werken!

Zijn er bijwerkingen met ZypAdhera?

Naast de bijwerkingen eigen aan de injectie zijn de andere nevenwerkingen vergelijkbaar met die van olanzapine tabletten.

Ze zijn meestal niet ernstig en verdwijnen na enkele weken. Bekijk de volgende tabel om te weten wat je moet doen als je één van deze bijwerkingen ondervindt.

Opgepast, niet iedereen heeft daar last van.

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
Slaperigheid	Je voelt je slaperig na je injectie. Treedt op bij ongeveer 2% van de patiënten.	Bestuur geen voertuigen of machines. Spontaan herstel binnen 24-72 uur na de injectie.
Gewichtstoename	Je hebt meer eetlust en je gewicht neemt toe.	Eet veel groenten en vezels.
Verhoogde prolactine	Kan een storend effect hebben op de maandstonden bij vrouwen en op de potentie bij mannen.	Meestal niet veront-rustend. Spreek hierover met je arts.
Metabole stoornissen	Veranderde bloedwaarden (glycemie, HDL, LDL, enz...)?? weet men wat deze termen willen zeggen	Je arts zal deze parameters opvolgen.
Andere bijwerkingen		Indien je nog een andere bijwerking zou voelen, bespreek dit dan met je arts.

Mag ik alcohol drinken?

In het begin van je behandeling met ZypAdhera mag je geen alcohol drinken. Je kan er erg slaperig van worden. Na enkele weken is het je toegelaten met mate te drinken.