

Mag ik alcohol drinken?

In het begin van je behandeling is dit af te raden. De kans is namelijk zeer groot dat je erg slaperig wordt. Na enkele weken mag je met mate drinken.

Mag ik met de auto rijden?

Het wordt afgeraden om met de wagen te rijden. Paliperidone kan je slaperig maken of kan er voor zorgen dat je zicht anders is (wazig). Wacht daarom even af hoe je reageert op je nieuw geneesmiddel en bespreek dit later opnieuw met je arts.

Wat moet je nog weten?

- Het is belangrijk dat je een geplande injectie niet overslaat. Als je de afspraak niet kan nakomen, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak. Het is ideaal dat de dosis om de 3 maanden vernieuwd wordt. Een marge van 2 weken voor of 2 weken na de toediening is echter toegelaten.
- Als je een oogoperatie moet ondergaan (staar of cataract) moet je vertellen aan je oogchirurg dat je dit geneesmiddel neemt. Je pupil zal misschien niet groot genoeg worden tijdens de ingreep en de chirurg moet hiervan op de hoogte zijn zodat hij er rekening kan mee houden.
- Gebruik dit geneesmiddel niet als je zwanger bent of borstvoeding geeft

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Neen, nu je je beter voelt, mag je niet plots stoppen. Als je dat doet zullen je klachten zeker terugkomen. Je zal Trevicta® gedurende een lange tijd toegediend krijgen, soms gedurende jaren. Stop dus niet, tenzij je arts dit heeft beslist.

Generieken

Er bestaan nog geen generieken.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers



Patiëntenfolder nr.



VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
C. Heymanslaan 10
9000 Gent
www.vza.be
secretariaat@vza.be

TWEEDE GENERATIE ANTIPSYCHOTICA

**PALIPERIDONE
(TREVICTA®)**

Waarom werd mij paliperidone voorgeschreven?

Paliperidone is een stof die gebruikt wordt voor de onderhoudsbehandeling van symptomen van schizofrenie bij volwassen patiënten.

Schizofrenie is een aandoening met 'positieve' en 'negatieve' symptomen. Positief worden symptomen genoemd als je symptomen hebt die normaal niet aanwezig zijn: je kan stemmen horen of dingen ervaren die er niet zijn (hallucinaties) of je kan dingen geloven die niet waar zijn (waanideeën) of je kan ongewoon achterdochtig zijn naar anderen.

Negatief betekent dat gevoelens of gedragingen ontbreken die normaal wel aanwezig zijn. Je kan teruggetrokken zijn of je reageert emotioneel niet of je hebt moeite met duidelijk spreken. Je kan je depressief, angstig en gespannen voelen.

Paliperidone kan de symptomen van je aandoening helpen verlichten en de kans verminderen dat je symptomen terugkeren.

Wat is Trevicta®?

Trevicta® is een extra langwerkende, inspuitbare vorm van paliperidone. Je hebt slechts één inspuiting nodig per 3 maanden. De inspuiting wordt in de spier van je bovenarm of bil ingespoten.

De werkzame stof paliperidone behoort tot de klasse van de antipsychotica of neuroleptica.

Is paliperidone veilig?

Paliperidone is veilig, als je je houdt aan wat je arts je voorschrijft.

Licht daarom steeds je arts in:

- wanneer je lijdt aan epilepsie of aan de ziekte van Parkinson of indien je problemen hebt met je hart, lever of nieren
- over welke geneesmiddelen jij op dit ogenblik inneemt (ook die zonder voorschrift)
- als je zwanger bent of het wenst te worden
- als je borstvoeding wenst te geven.
- als je suikerziekte hebt

Op basis van al deze gegevens zal je arts voor jou de ideale dosis bepalen en weet hij welke parameters hij voor jou moet opvolgen.

Hoe wordt mij paliperidone toegediend?

Je schakelt pas over op Trevicta® als je stabiel bent op de maandelijkse inspuiting Xeplion®. Je bent stabiel op Xeplion® als je minimum 2 tot 3 en liefst 4 inspuitingen kreeg van dezelfde dosis. De inspuiting wordt geplaatst in de bil- of deltoïd spier. De eerste inspuiting van Trevicta® wordt gegeven op de dag dat je normaal je volgende inspuiting van Xeplion® zou krijgen. De verdere inspuitingen volgen om de 3 maanden. Er zijn verschillende doseringen op de markt en bij elke nieuwe toediening kan de dosis aangepast worden

Wat voel ik na de toediening van paliperidone?

Zoals bij elke inspuiting kan je enige tijd wat pijn, een lichte zwelling of jeuk ervaren.

Zijn er bijwerkingen met Trevicta®?

In het begin kan je enkele bijwerkingen ervaren. Je neemt al langer geneesmiddelen met het actief product paliperidone en de bijwerkingen zijn dus niet geheel nieuw voor je. Raadpleeg onderstaande tabel om te weten hoe je best reageert.

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
Orthostatische hypotensie	Lage bloeddruk, vnl. bij plots rechtstaan	Tracht langzaam recht te komen. Vermijd het besturen van voertuigen en machines.
Slaapstoornissen	Moeilijk in slaap vallen of doorslapen	Indien storend: spreek erover met je arts.
Droge mond	Indien dit storend is, spreek erover met je arts.	
Parkinsonisme	o.a. speekselvloed, rusteloosheid, schokkende bewegingen, trillen,..	Sprek erover met je arts.
Metabole stoornissen	Veranderde bloedwaarden of lichaamsgewicht	Je arts zal deze parameters opvolgen.

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
Dyskinesie en dystonie	Onwillekeurige spier-trekkingen en -bewegingen van ogen, mond, tong, kaak.	Spreek erover met je arts
Andere bijwerkingen	Laat niet na deze te bespreken met je arts.	Laat niet na deze te bespreken met je arts.

We vermelden hieronder nog enkele zeer ernstige bijwerkingen die gelukkig zeer zelden voorkomen.

Het is goed de symptomen te herkennen zodat je zo snel mogelijk een arts kan verwittigen.

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
De vorming van een bloedklonter in de aderen, vooral in de benen; kan in de longen komen	o.a. zwelling, pijn en roodheid van het been, pijn op de borst, ademhalingsmoeilijkheden	Verwittig zo snel mogelijk een arts
Een beroerte	Plotselinge zwakte of een verdoofd gevoel in je gezicht, armen of benen, bijzonder aan één kant of als je onduidelijk gaat praten	Verwittig zo snel mogelijk een arts
Het maligne neuroleptica syndroom	Koorts, stijve spieren, zweten of verminderd bewustzijn	Verwittig zo snel mogelijk een arts
Priapisme	Een langdurige of pijnlijke erectie	Verwittig zo snel mogelijk een arts
Tardieve dyskinesie	Trekkende of schokkende bewegingen in je gezicht, je tong of andere lichaamsdelen die je niet onder controle hebt	Verwittig zo snel mogelijk een arts
Een allergische reactie	Koorts, zwelling van de mond, het gezicht, de lippen of de tong, jeuk, huiduitslag en soms ook dalen van de bloeddruk	Verwittig zo snel mogelijk een arts