

Mag ik alcohol drinken?

Het is beter om geen alcohol te drinken bij een behandeling met antidepressiva, zeker in de beginfase. Nadien, als je je wat beter voelt, mag je met mate drinken, maar laat in geen geval na je geneesmiddel in te nemen.

Mag ik met de auto rijden?

Hoewel reboxetine slechts een te verwaarlozen effect heeft op de rijvaardigheid is het toch beter pas een wagen te besturen als je volledig zeker bent dat je rijprestaties niet beïnvloed worden.

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Neen, nu je je beter voelt, mag je niet plots stoppen. Als je dat doet zullen je klachten zeker terug de kop opsteken. Behandelingen met antidepressiva zijn meestal lang nodig, soms tot verschillende jaren. Een verlengd gebruik is meestal niet gevaarlijk en veroorzaakt geen verslaving. De stopzetting van een behandeling moet steeds gebeuren in samenspraak met je behandelende arts!

Pletten?

Edronax is pletbaar.

Generieken

Geen generiek beschikbaar.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers



Patiëntenfolder nr. 34



VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
De Pintelaan 185
9000 Gent
09 332 29 77
www.vza.be
secretariaat@vza.be

**REBOXETINE
(EDRONAX®)**

Waarom werd mij een reboxetine voorgeschreven?

Een persoon op vijf is wel eens depressief in de loop van zijn leven. Men voelt zich dan droevig, leeg en terneergeslagen. Je mist energie en de interesse voor je werk of hobby's neemt af. Je valt moeilijk in slaap of wordt vroeg wakker. Om uit zo'n depressie te kunnen geraken, en vooral dan om verloren vitaliteit en motivatie te herstellen, kan de inname van reboxetine helpen.

Wat is reboxetine?

Reboxetine behoort tot een groep van antidepressiva, de specifieke Noradrenaline Reuptake Inhibitoren (NaRI) genoemd. Deze groep werkt specifiek in op de chemische boodschapper, noradrenaline, in de hersenen, die o.a. verantwoordelijk wordt geacht voor de regeling van onze alertheid en motivatie, naast zijn algemene invloed op onze stemming (humeur) en emoties.

Momenteel neem jij:

Is het veilig om reboxetine te nemen?

Als je je houdt aan wat je arts voorschrijft, is reboxetine een veilig antidepressivum

Licht wel je arts in als je:

- bloeddrukverlagende geneesmiddelen inneemt;
- zwanger bent of het wenst te worden;
- borstvoeding wenst te geven;
- lijdt aan stuipen of epilepsie;
- manische episoden hebt gehad (overactief gedrag of overactieve gedachten);
- tekens hebt van urinaire problemen, toegenomen omvang van de prostaat of een voorgeschiedenis van hartproblemen;
- lever- of nierproblemen hebt. Uw arts kan zo nodig de dosering aanpassen;
- oogproblemen hebt, zoals bepaalde types van glaucoom (verhoogde druk in het oog);
- andere geneesmiddelen tegen depressie neemt zoals MAO-remmers, tricyclische, nefazodon, SSRI's (zoals fluvoxamine) of lithium;
- andere MAO-inhibitoren zoals linezolid (een antibioticum) of methyleenblauw inneemt (zie rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?").

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Daar Edronax de werking van andere geneesmiddelen kan beïnvloeden, wordt u verzocht uw arts te informeren als u volgende geneesmiddelen inneemt:

- Bepaalde antimycotica, bijv. ketoconazol;
- Bepaalde antibiotica, bijv. erytromycine, rifampicine;
- Geneesmiddelen bekend onder de naam moederkoren-derivaten die gebruikt worden bij de behandeling van migraine of de ziekte van Parkinson;
- Bepaalde antidepressiva bekend onder de naam MAO-remmers, tricyclische, nefazodon, SSRI's (zoals fluvoxamine) of lithium;
- Andere MAO-inhibitoren zoals linezolid (een antibioticum) of methyleenblauw (die gebruikt worden bij de behandeling van hoge concentraties van methemoglobine in het bloed);
- Alle kaliumverliezende diuretica (waterafdrijvende middelen), bijv. thiaziden;
- Geneesmiddelen die gebruikt worden om epilepsie te behandelen, bijv. fenobarbital, carbamazepine en fenytoïne;
- Kruidengeneesmiddelen die sint-janskruid bevatten (*Hypericum perforatum*);

Hoe moet ik reboxetine innemen?

Neem je antidepressivum in met een glas water, liefst altijd op dezelfde tijdstippen. Als je zou vergeten om je reboxetine in te nemen, dan kan je dit nog na enkele uren inhalen. Neem echter geen dubbele dosis!

Wat voel ik na de inname van mijn reboxetine?

Een echte depressie begint slechts op te klaren na een tweetal weken behandeling met een antidepressivum, al kan het met reboxetine soms wel iets vlugger gebeuren. Geef vooral niet op! Je zal je na enkele weken veel kalmer voelen en je zult je beter kunnen concentreren. Niet elke dag zal even goed zijn, maar dat is normaal. Geef je geneesmiddel de tijd om te werken!

Zijn er bijwerkingen met reboxetine?

Er kunnen inderdaad wat bijwerkingen optreden, meestal van lichtere aard. De klachten zijn meestal niet ernstig en ze verdwijnen na ongeveer een week. Bekijk de volgende tabel om te weten wat je moet doen als je één van de bijwerkingen ondervindt. Let wel, niet iedereen heeft daar last van.

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
Droge mond	Weinig speekselvorming	<ul style="list-style-type: none">• Zuig op suikervrije snoepjes• Een mondspray gebruiken met kunstspeeksel• Verzorg je tanden
Constipatie	Opgestopt gevoel	<ul style="list-style-type: none">• Meer vezels en fruit in uw voeding• Eventueel een laxativum nemen
Slapeloosheid	Moeilijk inslapen of doorslapen	<ul style="list-style-type: none">• Opgepast met de wagen• Raadpleeg je arts
Zelfmoordideeën		Raadpleeg je arts
Verhoogde zweetsecretie		Raadpleeg je arts
Tachycardie	Versnelde polsen hartritme	<ul style="list-style-type: none">• Minder koffie drinken• Raadpleeg je arts
Vertigo	Je voelt je duizelig	<ul style="list-style-type: none">• Niet te snel rechtstaan• Ga liggen. Vermijd het besturen van voertuigen of het bedienen van machines
Urinereëntentie	Moeilijker plassen	Raadpleeg je arts
Andere bijwerkingen		Indien je nog een andere bijwerking zou voelen, bespreek dit dan met je arts