Mag ik alcohol drinken?

Drink geen alcohol tijdens je behandeling: het gebruik van alcohol met carbamazepine kan je heel duizelig maken. Je bent ook veel gevoeliger voor de effecten van alcohol. Daarom is het raadzaam geen alcohol te drinken.

Mag ik met de auto rijden?

Doordat het vermoeidheid en slaperigheid veroorzaakt kan carbamazepine je rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Vraag daarom steeds de toestemming van je arts alvorens je (opnieuw) een auto bestuurt.

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Neen, nu je je beter voelt mag je niet plots stoppen. Als je dat doet zullen je klachten zeker terug de kop opsteken. Als je de behandeling van je arts mag stoppen gebeurt dit best geleidelijk.

Pletten?

CR tabletten (gecontroleerde vrijgave) mag je niet pletten

Als je moeilijk kan slikken moet je dit melden aan je arts, die dan gewone tabletten (mag je pletten) of siroop kan voorschrijven

Andere indicatie

Carbamazepine kan ook gebruikt worden in de behandeling van zenuwpijnen.

Generieken

Er zijn generieken beschikbaar.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019

VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
De Pintelaan 185
9000 Gent
09 332 29 77
www.vza.be
secretariaat@vza.be

Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Patiëntenfolder nr. 41

CARBAMAZEPINE

Waarom werd mij carbamazepine voorgeschreven?

Sommige mensen lijden aan ernstige stemmingsschommelingen. Soms ben je vol energie en voel je je opgeruimd. Je kan ook prikkelbaar zijn en nauwelijks aan slapen toekomen. Dit noemen we hypomanie. Op andere ogenblikken is je stemming erg bedrukt en voel je je depressief.

Heel wat mensen wisselen periodes van hypomanie af met periodes van depressie. Sommigen hebben enkel depressieve periodes. Carbamazepine helpt in beide gevallen.

Momenteel neem jij: ……..

Waarom wordt er een bloedafname gedaan?

Eerst zal je arts een bloedafname doen om na te gaan of carbamazepine bij jou op een veilige manier gebruikt kan worden. Je leverfunctie dient volledig in orde te zijn. Nadat je enkele dagen carbamazepine hebt genomen zal er een nieuwe bloedafname gebeuren om na te gaan of de voorgeschreven dosis correct is. Nadien zal er maar om de drie tot zes maand een bloedonderzoek nodig zijn.

Is carbamazepine veilig?

Carbamazepine is veilig als je je houdt aan de richtlijnen van je arts. Toch is carbamazepine niet geschikt voor iedereen.

Licht daarom steeds je arts in:

- als je problemen hebt met je hart, lever of nieren;
- over welke geneesmiddelen je neemt of nam (ook die welke je zonder voorschrift hebt aangekocht);
- indien je zwanger bent of het wenst te worden;
- als je borstvoeding wenst te geven.

Je hebt een doktersvoorschrift en nodig als je carbamazepine afhaalt bij je apotheker.

Bewaar je geneesmiddel buiten het bereik van kinderen en geef het nooit aan anderen.

Hoe moet ik mijn carbamazepine innemen?

Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis en volg de richtlijnen van je arts goed op. In het begin van de behandeling kan je arts de dosis op een langzame manier opbouwen. Neem het geneesmiddel steeds in met een glas water. Indien je zou vergeten om je carbamazepine in te nemen, dan kan je dit nog na enkele uren inhalen. Neem zeker geen dubbele dosis.

Wat voel ik na de inname van mijn carbamazepine?

Wanneer je carbamazepine inneemt voor stemmingsschommelingen kunnen deze nog enkele maanden aanhouden. Geef vooral niet op! Niet alle dagen zullen even goed zijn, maar dat is heel normaal. Uiteindelijk zal je steeds minder dagen kennen waarop je je droevig of rusteloos voelt. Geef je carbamazepine in elk geval de tijd om te werken.

Zijn er bijwerkingen met carbamazepine?

In het begin van je behandeling kan je bijwerkingen ondervinden. Deze zijn meestal niet ernstig en verdwijnen na enige tijd. Raadpleeg onderstaande tabel om te weten wat je moet doen. Let wel, niet iedereen heeft er last van!

Bijwerking	Wat is het?	Wat moet ik doen?
Huiduitslag, allergische reactie	Uitslag, dikwijls gepaard met zweren in de mond, de keel en de neus, vaak voorafgegaan door griepachtige symptomen	Raadpleeg onmiddellijk je arts
Slaperigheid	Je voelt je vermoeid de eerste uren na de inname.	• Vermijd het besturen van voertuigen of het bedienen van machines. • Overleg met je arts of je je geneesmiddel beter op een ander tijdstip neemt
Diplopie	Je ziet dubbel	Vermijd het besturen van voertuigen of het bedienen van machines; je hoeft geen nieuwe brilglazen Raadpleeg eventueel je arts
Vertigo	Je voelt je duizelig	Ga liggen Kom traag recht Vermijd het besturen van voertuigen of het bedienen van machines
Nausea	Je voelt je misselijk.	Indien het erg is, bespreek dit met je arts.
Andere bijwerkingen		Indien je nog een andere bijwerking zou voelen, bespreek dit dan met je arts.