

Mag ik met de auto rijden?

Mensen met epilepsie mogen vaak gedurende een bepaalde periode na een aanval geen auto besturen. Topiramaat kan slaperigheid, duizeligheid en zichtstoornissen of troebel zicht veroorzaken, wat je rijvaardigheid negatief kan beïnvloeden. Vraag daarom steeds toestemming aan je arts alvorens je (opnieuw) een auto bestuurt.

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Neen, nu je je beter voelt, mag je niet plots stoppen. Als je dat doet zullen je klachten zeker terug de kop opsteken. Je zal je Topiramaat lang moeten nemen, soms gedurende jaren. Je mag nooit je behandeling zonder toelating van je arts stoppen, want dan kunnen je epileptische aanvallen toeneemen. Als je de behandeling van je arts mag stoppen, gebeurt dit best geleidelijk.

Pletten?

Topiramaat is verkrijgbaar in tabletten en capsules. Indien je moeilijk kan slikken gebruik je beter de harde capsules die je kan openen, aangezien de tabletten een slechte smaak hebben wanneer ze geplet worden. De inhoud van de geopende capsules kan je verstrooien op een lepeltje met wat zacht voedsel. Dit mengsel van voedsel en geneesmiddel moet onmiddellijk zonder te kauwen doorgeslikt worden.

Andere indicatie

Je kan Topiramaat preventief nemen om migraine-aanvallen te voorkomen

Generieken

Er zijn generieken beschikbaar.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers



Patiëntenfolder nr. 46



VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
De Pintelaan 185
9000 Gent
09 332 29 77
www.vza.be
secretariaat@vza.be

TOPIRAMAAT

maat?

Waarom werd mij topiramaat voorgeschreven?

Topiramaat is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven aan mensen die lijden aan epilepsie om aanvallen te voorkomen. Je kan het gebruiken als enige behandeling of in combinatie met andere anti-epileptica.

Momenteel neem jij:

Is topiramaat veilig?

Topiramaat is veilig als je je houdt aan de richtlijnen van je arts.

Licht steeds je arts in:

- Over welke geneesmiddelen en voedingssupplementen je neemt of nam (ook die welke je zonder voorschrift hebt aangekocht);
- Over problemen met je nieren en/of lever;
- Als je zwanger bent of het wenst te worden;
- Als je borstvoeding wenst te geven
- Als je ooit een allergische reactie hebt gehad bij inname van dit of een ander geneesmiddel.

Je hebt een doktersvoorschrift en een attest van je ziekenfonds nodig als je topiramaat afhaalt bij je apotheker en wil genieten van een terugbetaling.

Bewaar je geneesmiddel steeds op een koele, droge plaats en uit de buurt van directe warmte en licht. Bewaar het buiten bereik van kinderen en geef het niet door aan anderen.

Hoe moet ik mijn topiramaat innemen?

Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis en volg de richtlijnen van je arts goed op.

In het begin van de behandeling kan je arts de dosis langzaam opbouwen. Neem je geneesmiddel in met voldoende water (een glas), al dan niet tijdens de maaltijd.

Indien je zou vergeten om je topiramaat in te nemen, haal dit dan zo snel mogelijk in. Neem zeker geen dubbele dosis.

Wat voel ik na de inname van mijn topira-

Topiramaat beïnvloedt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar zodat ze niet te snel reageren. Hierdoor helpt het bepaalde epileptische aanvallen te voorkomen.

Na enkele weken zal duidelijk zijn of topiramaat voldoende werkt. Je aanvallen zullen minder vaak voorkomen, minder hevig zijn en misschien volledig verdwijnen.

Zijn er bijwerkingen met topiramaat?

In het begin van je behandeling kan je bijwerkingen ondervinden. Deze zijn meestal niet

ernstig en verdwijnen na enige tijd. Raadpleeg onderstaande tabel om te weten wat je moet doen.

Let wel, niet iedereen heeft er last van!

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
Vermoeidheid, duizeligheid, slaperigheid		Indien geen verbetering, raadpleeg je arts
Nasofaryngitis	Neus- en keelontsteking	Raadpleeg je arts wanneer je keelpijn en koorts hebt.
Nausea, buikpijn	Misselijkheid	Neem je topiramaat tijdens of na het eten.
Oogstoornissen, wazig zien		Raadpleeg je arts
Gewichtsverlies Verminderde eetlust	Vermageren	Voedingssupplement of extra voedsel nemen
Andere bijwerkingen		Raadpleeg je arts

Raadpleeg steeds je arts wanneer er een toename is van de ernst en/of aantal aanvallen.

Mag ik alcohol drinken?

Het is beter geen alcohol te gebruiken wanneer je topiramaat neemt. Alcohol versterkt het versuftend effect van topiramaat, ook als je dit voorheen niet hebt opgemerkt.