

ALBUMINE

(ALBUMINE RK®)

Afleveringsvorm

Flacon met 2 g = 10 ml en 20 g = 100 ml (200 mg/ml) albumine

Toedienen

Intraveneus als infuus: onverdund of verdund in NaCl 0,9% of glucose 5%. De dosis, de toedieningssnelheid en de duur van de therapie is afhankelijk van de conditie van de patiënt.

volwassen: toedieningssnelheid is 5-40 g/uur

kind: toedieningssnelheid is 3-6 g/uur

Code voor toedienen

Categorie B

Houdbaarheid

Na aanprikken: 24 uur bij 4 (C)

Infuusvloeistoffen

Glucose 5% en 10%, NaCl 0,9%, NaCl/Glucose, Ringer lactaat

Bijzonderheden

Albumine mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en gemiddelen worden toegediend.

Bij voorkeur het produkt op kamertemperatuur laten komen voor toedienen.

Nauwgezette controle van centraal veneuze druk is noodzakelijk om het risico op circulatoire overvulling te voorkomen.

Toedienen van albumine is eventueel geïndiceerd bij een spiegel lager dan 25 g/l.

Bevat 13-16 mmol natrium per 100 ml.

Acute reacties

Ten gevolge van te snelle toediening: hypertensie, hypervolemie

Bijwerkingen

Zelden koorts en rillingen, braken, gevolgd door transpiratie, urticaria.