

# METRONIDAZOLE

(ANAEROMET<sup>®</sup>)

## Afleveringsvorm

Flacon of zak met 500 mg = 100 ml (5 mg/ml) metronidazol (in fosfaatbuffer)

## Toedienen

**volwassen en kind;** Intraveneus als kortlopend infuus: onverdund, in minimaal 20 minuten, de toedieningssnelheid is maximaal 25 mg/min.  
(**neonatologie:** zo nodig verdunnen met glucose 5%)

## Code voor toedienen

Categorie B

## Houdbaarheid

Buiten invloed van licht, zie vermelde datum op verpakking  
Na aanprikken: 24 uur bij 20 °C  
Niet bij 4 °C bewaren.

## Verenigbaar met

Y-site: aciclovir, allopurinol, amiodaron, enalapriilaat, esmolol, fentanyl, foscarnet, labetalol, magnesiumsulfaat, morfine, oxytocine, pethidine  
Infuus: aminoglycosiden, cefalotine, cefazoline, cefotaxim, ceftazidim, cefuroxim, chlooramfenicol, cimetidine, ciclosporine, ciprofloxacin, clindamycine, disopyramide, fluconazol, heparine, hydrocortison, penicillinen, theofylline

## Onverenigbaar met

Y-site: filgastrim  
Infuus: aztreonam, ceftriaxon, dopamine

## Acute reacties

Overgevoeligheidsreacties

## Bijwerkingen

Tromboflebitis, metaalsmaak, maagdarfstoornissen, leukopenie, stomatitis, hoofdpijn, duizeligheid, antabus-effect. Ten gevolge van langdurig gebruik: sensibiliteitsstoornissen, ataxie. Ten gevolge van hoge doseringen: donkerbruinverkleuring van de urine