

# PAMIDRONINEZUUR

( AREDIA<sup>®</sup>)

## Afleveringsvorm

Ampul met 15 mg = 5 ml (3 mg/ml) dinatriumpamidronaat

## Toedienen

Intraveneus als infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5% tot een maximale concentratie van 120 mg/l. Toedieningsnelheid is maximaal 90 mg in 2-24 uur (meestal 15 mg/uur).

## Code voor toedienen

Categorie B

## Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C of 4 °C

## Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

## Onverenigbaar met

Calcium-bevattende infuusvloeistoffen

## Bijzonderheden

Intraveneuze bolusinjectie is niet mogelijk i.v.m. kans op calciumneerslagen in de nier en de kans op ernstige lokale reacties en tromboflebitis.

## Acute reacties

Pijnlijkheid op injectieplaats

## Bijwerkingen

Tromboflebitis, koorts, malaise, hoofdpijn, metaalsmaak, spierpijn, hypotensie, hypertensie, lymfopenie en granulocytopenie, hypofosfatemie, hypomagnesiëmie, hypocalciëmie, voorbijgaande temperatuursverhoging.