

Clarithromycine

Biclar®

Afleveringsvormen

Biclar IV: flesje dat 500 mg clarithromycine bevat in de vorm van lactobionaat, bestemd voor perfusie na voorafgaandelijke dilutie

Dosering

Volwassenen

De aanbevolen dosis bedraagt 1 g per dag, verdeeld over twee gelijke perfusies. De behandeling moet binnen de 2 à 5 dagen worden beëindigd. Ze moet zo snel mogelijk door een orale behandeling worden vervangen.

Bereiden van de intraveneuze vorm

Het gelyofiliseerd poeder altijd eerst met 10 ml water voor injectie oplossen. Het product lost met **fysiologisch niet** op (viskeuze filmvorming!!!).

Deze moederoplossing wordt dan verder verdund met 250 ml glucose 5% of NaCl 0.9%.

Toedieningswijze

Intraveneus als infuus: na oplossen (zie "bereiden van de intraveneuze vorm") toegevoegd aan 250 ml NaCl 0.9% of glucose 5%, gegeven over 60 minuten.

Biclar IV mag niet als bolusinjectie, noch intramusculair gegeven worden.

Houdbaarheid

Onverdunde oplossing: 24 uur bij kamertemperatuur en 48 uur bij 5°C.

Verdund: 6 uur bij kamertemperatuur en 48 uur bij 5°C.

Onverenigbaar met

Aan de uiteindelijke, verdunde oplossing van Biclar IV mag geen enkel geneesmiddel of chemisch product worden toegevoegd, tenzij men er zich op voorhand van heeft verzekerd dat de toevoeging van dit product geen enkel negatief effect heeft op de chemische of fysische stabiliteit van de bereiding.

Bijzonderheden

Het is verstandig de dosis aan te passen aan leverfunctietests en op te letten bij patiënten met matige of ernstige nierinsufficiëntie.

Er is kruisresistentie mogelijk met andere macroliden, lincomycine en clindamycine.

Er kan zich pseudomembraneuze colitis of superinfectie van ongevoelige kiemen voordoen.

Er werden nog geen studies met Biclar IV bij kinderen gedaan.

Bijwerkingen

Lokale ontsteking op de injectieplaats (flebitis, pijn).

Gastro-intestinaal ongemak.

Leverfunctiestoornissen, veelal reversibel.

Biclar kan leiden tot allergische reacties tot in zijn ergste vorm.