

CASPOFUNGIN

(CASPOFUNGIN®)

Afleveringsvorm

- Flacon met 50 MG poeder voor intraveneuze infusie
- Flacon met 70 MG poeder voor intraveneuze infusie

Bereiden

- Stap 1: reconstitutie injectieflacons

Om het poeder te reconstituëren moet de injectieflacon eerst op kamertemperatuur worden gebracht. Het poeder wordt gereconstitueerd met 10,5 ML water voor injectie. De concentratie van de gereconstitueerde injectieflacon wordt dan: 5 MG/ML (voor de 50 MG) of 7 MG/ML (voor de 70 MG).

Daarna vermengen totdat een heldere oplossing wordt verkregen. De gereconstitueerde oplossing moet visueel worden gecontroleerd op deeltjes of verkleuring.

- Stap 2: toevoeging van gereconstitueerde caspofungin aan infusie-oplossing

De nodige hoeveelheid gereconstitueerd concentraat moet toegevoegd worden aan een 250 ML 0,9% natriumchloride oplossing of lactaat bevattende Ringer-oplossing.

Bij het gebruik van een dagelijkse dosis van 50 MG of 35 MG kan gebruik worden gemaakt van een infuusvolume van 100 ML. Dit is niet aanbevolen voor de 70 MG initiële dosis.

Gebruik de oplossing niet als deze troebel is of bezinksel bevat.

Vb.

Dosis 50 MG

* 10 ML van de gereconstitueerde 50 MG flacon toegevoegd aan 250 ML oplossing levert 0,19 MG/ML oplossing op

* 10 ML van de gereconstitueerde 50 MG flacon toegevoegd aan 100 ML oplossing levert 0,45 MG/ML oplossing op

Dosis 35 MG

* 7 ML van de gereconstitueerde 50 MG flacon toegevoegd aan 250 ML oplossing levert 0,14 MG/ML oplossing op

* 7 ML van de gereconstitueerde 50 MG flacon toegevoegd aan 100 ML oplossing levert 0,32 MG/ML oplossing op

Dosis 70 MG

* 10 ML van de gereconstitueerde 70 MG flacon toegevoegd aan 250 ML oplossing levert 0,27 MG/ML oplossing op

Toedienen

Na reconstitutie en verdunning moet de oplossing worden toegediend via een langzaam intraveneuze infusie van ongeveer 1 uur.

Houdbaarheid

Uit microbiologisch standpunt oogpunt moet Caspofungin, éénmaal gereconstitueerd en/of verdund, onmiddellijk gebruikt worden. De bewaartijd mag in ieder geval niet langer zijn dan 24 uur bij 2°C tot 8°C.

Infuusvloeistoffen

NaCl 0.9%, lactaat bevattende Ringer-oplossing

Onverenigbaar met

Caspofungin is onverenigbaar met glucose.

Caspofungin mag niet samen met andere geneesmiddelen toegediend worden.

Datum opmaak en bron

22 mei 2003, Wetenschappelijke bijsluiter Caspofungin