

CLONIDINE

(CATAPRESAN[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 150 microg = 1 ml (150 microg/ml) clonidine-hydrochloride

Toedienen

Subcutaan: onverdund

Intramusculair: onverdund

Intraveneus als bolusinjectie: toegevoegd aan tenminste 10 ml NaCl 0,9%, in 10 minuten (Intraveneus met behulp van spuitpomp)

Code voor toedienen

Categorie A

Bekwaamheidsniveau

S.C./I.M.: 2

I.V.: 3

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking

Bijzonderheden

Alleen bij liggende patiënten injecteren.

Acute reacties

Exantheem

Bijwerkingen

Slaperigheid, droge mond, vermoeidheid, anorexie, duizeligheid, misselijkheid, obstipatie, visusstoornissen, parotispijn, bradycardie. Ten gevolge van i.v. injectie: orthostatische hypotensie. Ten gevolge van hoge doseringen bij toepassing bij migraine, flushing en onthoudingsverschijnselen: hypotensie. Zelden: hallucinaties.

Na staken van de medicatie: rebound-hypertensie, met opwinding, slapeloosheid, tremor en hartkloppingen.

Bereiden

Voeg 3 ampullen 150 microg = 3 ml clonidine toe aan 42 ml NaCl 0,9%. De eindconcentratie is 10 microg/ml (0,01 mg/ml); 45 ml

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Toedienen via perfusor

Gebruikelijke doseringen: 20-90 microg/uur (0,5-2 mg/24 uur)

Oplaaddosis: bolusinjecties van 30 microg per 3 minuten, op geleide van de HF en/of MAP (HF gedaald tot ongeveer 80 sl/min en/of MAP tot ongeveer 70 mm Hg)

Onderhoudsdosis: starten met 40 microg/uur op geleide van de HF (bij een HF lager dan 70 sl/min de dosering halveren)

SPUITENPOMP eindconcentratie is 10 microg/ml		
ml/uur	microg/uur	mg/24 uur
1,0	10	0,24
2,0	20	0,48
3,0	30	0,72
4,0	40	0,96
5,0	50	1,20
6,0	60	1,44
7,0	70	1,68
8,0	80	1,92
9,0	90	2,16