

CEFAZOLINE

(CEFACIDAL[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 250 mg cefazoline (als natriumzout) poeder voor injectievloeistof
Flacon met 1000 mg cefazoline (als natriumzout) poeder voor injectievloeistof
Flacon met 2000 mg cefazoline (als natriumzout) poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties, NaCl 0,9%

Bereiden

Los 1000 mg op in 2,5 ml water voor injecties. De concentratie is 330 mg/ml

Toedienen

Intramusculair: onverdund
Intraveneus als bolusinjectie: maximaal 1000 mg, toegevoegd aan tenminste 10 ml water voor injecties, in 3-5 minuten
Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%
Intraveneus als continu infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Onverdund en na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, 10%, NaCl/glucose

Verenigbaar met

Y-site: aciclovir, allopurinol, enalapriilaat, esmolol, famotidine, filgastrim, fluconazol, foscarnet, insuline, labetalol, lidocaine, magnesiumsulfaat, morfine, ondansetron, pethidine

Infuus: aztreonam, clindamycine, fluconazol, metronidazol, verapamil

Onverenigbaar met

Y-site: calciumzouten, erythromycine, pentobarbital, tetracycline
Infuus: aminoglycosiden, cimetidine, lidocaine, pentamidine

Bijzonderheden

ENKEL IN PROFYLAXIE

Cefazoline kan, ter vermindering van de pijn bij i.m. toediening, ook in 2,5 ml lidocaine 0,5% worden opgelost.

Bevat 2,1 mmol natrium per 1000 mg.

Er bestaat een kruisovergevoeligheid/-resistentie tussen andere cefalosporinen en penicilline.

Acute reacties

Ten gevolge van i.m. toediening: pijnlijkheid op injectieplaats. Exantheem, jeuk, eosinofilie.

Zelden: angio-oedeem, anafylactische shock

Bijwerkingen

Tromboflebitis, koorts, misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, pruritus vaginalis, bloedbeeldafwijkingen, tijdelijke verhoging leverenzymen. Zelden: convulsies, pseudomembraneuze colitis