Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

CNK 2566-974
ATCJ01DD04

# CEFTRIAXONE Fresenius Kabi® 2 g

**Stofnaam** natrium-ceftriaxone

**Klasse** Antibacteriële middelen – Cefalosporines– derde groep

**Farmaceutische vorm** Poeder voor oplossing voor injectie.

## Bereiden

**Oplossen met**

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 40 -50 ml NaCl 0,9 % OF 40 - 50 ml glucose 5 %

**Verder verdunnen met**

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

## Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie infusie toedienen over tenminste 30 minuten

## Houdbaarheid/Bewaarcondities

**Product** Injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming Tegenlicht. Kamertemperatuur

**Na oplossen** 12 uur bij 25 °C

**Na verdunnen met** 48 uur bij 2 – 8°C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

**Verenigbare infusen** glucose 5% in NaCl 0,45%, glucose 5% in NaCl 0,9%

**Onverenigbare infusen** calciumhoudende IV-oplossingen, Ringer, Hartmann

**Bijzonderheden**

De gereconstitueerde oplossing moet gedurende 60 seconden geschud worden om een volledige oplossing van ceftriaxone te krijgen.

pH = 6 - 8

**Bronnen**

1. SKP Ceftriaxone Fresenius Kabi®(08/2014)
2. Handbook of injectable medicines (online, 27/05/2016)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(27/05/2016)

**DISCLAIMER**
Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.