

# Mycofenolaat Mofetil

(Cellcept®)

## Afleveringsvorm

1 g mycofenolaat mofetil op 250 ml glucose 5% voor infusie (4 mg/ml)

## Bereiden

De bereiding van het poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie gebeurt onder aseptische omstandigheden in de apotheek.

## Toedienen

Een oplossing van 4 mg/ml dient toegediend te worden als langzaam intraveneus infuus over een periode van 2 uur via een perifere of een centrale vene.

## Infuusvloeistof

Glucose 5% oplossing.

## Houdbaarheid

Wanneer de bereiding niet onmiddellijk kan worden toegediend, bewaar de oplossing dan in de koelkast en overschrijd zeker de datum aangeduid op de bereidingszak niet (7 dagen na bereiding in koelkast).

## Onverenigbaarheden

Cellcept® 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie mag niet gemengd worden met een ander intraveneus geneesmiddel. Het mag ook niet via dezelfde katheder samen worden toegediend met een ander intraveneus geneesmiddel of infuustoevoeging.

## Acute reacties

- In combinatie met corticoïden ziet men geregeld: diarree, leukopenie, sepsis en braken
- Afhankelijk van de intensiteit en duur van immunosuppressie worden lymfomen en andere maligniteiten van vnl. de huid gezien. Beperkte blootstelling aan zonlicht, UV licht, het dragen van beschermende kledij en het opbrengen van een crème met hoge zonnebrandfactor is aangewezen om de kans op huidkanker te minimaliseren.

## Bijzonderheden

- Deze patiënten dienen gecontroleerd te worden op neutropenie.
- Het mag enkel worden toegediend bij zwangere vrouwen als het potentiële voordeel opweegt tegen het potentiële risico voor de foetus.
- Bij het geven van borstvoeding is er ook een mogelijkheid tot ernstige bijwerkingen voor het kind. De beslissing voor het stoppen met Cellcept® of het stoppen met borstvoeding dient overwogen te worden.

## Bron

Compendium 2004