

# Quinine hydrochloride

## (CHININI BIHYDROCHLORIDUM)

### Afleveringsvorm

Ampul met 250 mg = 2 ml (125 mg/ml) kinine-dihydrochloride

### Toedienen

Intraveneus als infuus: 20 mg/kg, toegevoegd aan 500 ml infuusvloeistof (max. 1800 mg), in 4 uur toedienen, onderhoud 10 mg/kg (max. 600 mg), in 4 uur toedienen, elke 8 u (monitoring tijdens toediening van vitale functies).

(Intramusculair: onverdund)

### Code voor toedienen

Categorie A en B

### Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C (14)

### Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

### Bijzonderheden

Intraveneuze toediening als bolusinjectie wordt ontraden vanwege de kans op irreversibele blindheid.

Intramusculaire toediening is pijnlijk en kan weefselnecrose veroorzaken.

### Acute reacties

Pruritus, urticaria, blozen, dyspnoe, angio-oedeem.

### Bijwerkingen

Duizeligheid, gehoorstoornissen, oorsuizen, tremoren, hoofdpijn, rillingen, visusstoornissen, misselijkheid. Ten gevolge van te snelle intraveneuze-infusie: hypotensie tremor, convulsies, coma