

CIPROFLOXACINE

(CIPROXINE[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 200 mg = 100 ml (2 mg/ml) ciprofloxacin (als lactaat)
Flexibag met 400 mg = 200 ml (2 mg/ml) ciprofloxacin in glucose 5%

Toedienen

Intraveneus als infuus: onverdund of na voorafgaande toevoeging van compatibele oplossingen, in 60 minuten

Code voor toedienen

Categorie B

Houdbaarheid

Na aanpakken: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%, NaCl 0,9%, NaCl/glucose

Verenigbaar met

Y-site: calciumgluconaat, ciclosporine, cimetidine (18), digoxine, dobutamine, dopamine, fluconazol (18), gentamicine, kaliumchloride, lidocaine, metoclopramide, midazolam (18), noradrenaline (18), prednisolon, promethazine, ranitidine, verapamil
Infuus: aminoglycosiden, aztreonam

Onverenigbaar met

Y-site: amfotericine B, ampicilline, ceftazidim, cefuroxim, corticosteroiden, fenytoïne, furosemide, heparine, magnesiumsulfaat, metronidazol, natriumbicarbonaat, piperacilline, theofylline, ticarcilline (18)
Infuus: amoxicilline, clindamycine

Acute reacties

Rash, pruritus, urticaria.
Zelden: larynxoedeem, longoedeem, dyspnoe, angio-oedeem, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, arthralgie, voorbijgaande leverfunctie- en bloedbeeldafwijkingen, tachycardie, hypotensie. Maagdarmstoornissen als: maagpijn, buikpijn, anorexie, misselijkheid, braken, diarree, pseudomembraneuze colitis. Centrale bijwerkingen als: hoofdpijn, slaapstoornissen, duizeligheid, sufheid, transpireren, paresthesieën, perifere neuropathie, visusstoornissen,

verwardheid, convulsies, onrust, paniekreacties, hallucinaties, reuk-,
kleur- en smaakstoornissen. (CIPROXINE®)