

CEFOTAXIM

(CLAFORAN[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 1000 mg en 2000 mg cefotaxim (als natriumzout) poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties

Bereiden

Los 1000 mg cefotaxim op in 4 ml water voor injecties.

Los 2000 mg cefotaxim op in 10ml water voor injecties

Toedienen

volwassen:

Intramusculair: onverdund, diep spuiten

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 3-5 minuten.

Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in 30 minuten

Intraveneus als continu infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%

kind:

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 3-5 minuten

Intraveneus als kortlopend infuus: verdund met NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 20 mg/ml in 30 minuten (maximale concentratie bij vochtbeperking 60 mg/ml (17))

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Onverdund en na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

Verenigbaar met

Y-site: aciclovir, ciclosporine, fentanyl, magnesiumsulfaat, morfine, ondansetron, pethidine, tolazoline

Infuus: clindamycine, famotidine, heparine, metronidazol, verapamil

Onverenigbaar met

Y-site: allopurinol, filgastrim, fluconazol

Infuus: aminoglycosiden, calciumzouten, doxapram, natriumbicarbonaat, pentamidine, theofylline

Bijzonderheden

Cefotaxim kan, ter vermindering van de pijn bij i.m. toediening, ook opgelost worden in 2 ml lidocaine 1%.

Aanbevolen wordt maximaal 1 g per injectieplaats toe te dienen.

Intraveneuze toediening heeft de voorkeur.

Er bestaat kruisovergevoeligheid voor andere cefalosporinen en penicilline.

Bevat 2,1 mmol natrium per 1000 mg.

Acute reacties

Ten gevolge van i.m. toediening: pijnlijkheid op injectieplaats. Exantheem, jeuk, eosinofilie.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, koorts, misselijkheid, braken, diarree, bloedbeeldafwijkingen, tijdelijke verhoging leverenzymen.

Zelden: pseudomembraneuze colitis