

ZUCLOPENTIXOL

CLOPIXOL ACUTARD[®], CLOPIXOL DEPOT

Afleveringsvorm

Ampul met 50 mg = 1 ml (50 mg/ml) zuclopentixolacetaat ("Acutard") in olie
Ampul met 200 mg = 1 ml (200 mg/ml) zuclopentixoldecanoaat ("Depot") in olie

Toedienen

Intramusculair: diep spuiten

Code voor toedienen

Categorie A

houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking

Bijzonderheden

Zuclopentixol mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen worden toegediend.

De Acutardinjectie en de Depotinjectie bevatten beiden als oplosmiddel plantaardige olie (Viscoleo) en kunnen met elkaar gemengd worden.

Maximale concentraties worden bereikt bij de Acutardinjectie na 24-48 uur en bij de Depotinjectie na 1 week.

Acute reacties

Pijnlijkheid op injectieplaats

Bijwerkingen

Extrapiramidale effecten, convulsies, verergering van de depressie, sufheid, slaperigheid, orthostatische hypotensie, droge mond, visusstoornissen, obstipatie, urineretentie, opwinding en delirium (met name bij ouderen en kinderen), leverfunctiestoornissen, hyperprolactinemie. Ten gevolge van langdurig gebruik: gynaecomastie