

COLISTINE

(COLIMYCINE B®)

Afleveringsvorm:

flacon met natriumcolistimethaat (oplosbare zoutvorm van colistin) poeder voor injectie, intraveneuze infusie of inhalatie
benodigd oplosmiddel : 4 ml NaCl 0.9%

Bereiden :

Volwassenen:

Intraveneuze injectie na reconstitutie met 4 ml.

intraveneus: de gereconstitueerde flacon kan toegevoegd worden aan volgende infusievloeistof NaCl 0.9%.

B.v. 1 miljoen eenheden (=2 ml) in 50 ml fysiologisch. De opgeloste flacon van 4 ml kan 24 uur bewaard worden in koelkast (mits etikettering van aanvangsuur en-dag van aanprikken) zodat voor volgende toedieningen dezelfde flacon kan gebruikt worden.

Maximale intraveneuze dosis is 6 miljoen eenheden over 24 uur. Deze intraveneuze dagdosis wordt verdeeld over 3 toedieningen per dag met een tussentijd van 8 uur.

Via inhalatie wordt een maximumdosis van twee miljoen eenheden, driemaal daags aangegeven in de bijsluiter.

Toedienen:

intraveneus : traaglopend infuus (30 min - 1 uur)

intraveneuze injectie: over 5 minuten

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Infuus onmiddellijk te gebruiken. De gereconstitueerde (niet doorverdunde) flacon 24 uur in koelkast.

Bijzonderheden

Onverenigbaar met aminosides en cefalosporines, erythromycine, soluortef

Informatie: bijsluiter 2005, Martindale 30^e editie