

# TRAMADOL

## CONTRAMAL

### AFLEVERINGSVORM

Ampul met 100 mg=2 ml (50 mg/ml ) tramadol-hydrochloride

### TOEDIENEN

- intramusculair: onverdund
- intraveneus als bolusinjectie: onverdund, maximaal 50 mg per 1- 2 minuten
- intraveneus als infuus: toegevoegd aan NaCL 0.9% of glucose 5%

### CODE VOOR TOEDIENEN

Categorie A en B

### INFUUSVLOEISTOFFEN

NaCL 0.9%, glucose 5%, Ringerlactaat

### VERENIGBAAR MET

Butylscopolamine, clomipramine, haloperidol, imipramine, levomepromazine, maprotiline, metoclopramide, sulpiride

### ONVERENIGBAAR MET

Diazepam, diclofenac, indometacine, midazolam, piroxicam

### BIJZONDERHEDEN

Tijdens hemodialyse of hemofiltratie blijkt tramadol zeer langzaam uit het lichaam te worden verwijderd. Een post-dialyse dosering is daarom niet noodzakelijk.

### ACUTE REACTIES

Na snelle intraveneuze toediening: orthostatische reacties en een hogere incidentie van onderstaande bijwerkingen.

### BIJWERKINGEN

Misselijkheid, braken, dyspepsie, obstipatie, moeheid, sufheid, duizeligheid, pruritus, zweten, flush, droge mond, hoofdpijn.

- 
-