

AMIODARONE

(CORDARONE[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 150 mg = 3 ml (50 mg/ml) amiodaronhydrochloride. **De vracampullen dienen buiten de invloed van licht bewaard worden.**

Toedienen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund 5 mg/kg, in tenminste 3 minuten
Intraveneus met behulp van volumetrische spuitpomp

Code voor toedienen

Categorie A en D

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: **12 uur bij 20 °C, buiten invloed van licht te bewaren**
Bij toediening met spuitpomp dienen strikt genomen geen lichtafgeschermdde spuiten gebruikt te worden.

Infuusvloeistoffen

glucose 5%

Verenigbaar met

Y-site: amikacine, benzylpenicilline, clindamycine, doxycycline, erythromycine, esmolol, fentolamine, gentamicine, insuline, labetalol, midazolam, metronidazol, morfine, noradrenaline, tobramycine, vancomycine
Infuus: dobutamine, dopamine, isoprenaline, kaliumchloride, lidocaine, nitroglycerine, procainamide, verapamil

Onverenigbaar met

Y-site: cefamandol, cefazoline, heparine, natriumbicarbonaat, theofylline
Infuus: flucloxacilline, furosemide

Bijzonderheden

Bevat benzylalcohol en polysorbaat: het aantal druppels per ml is daardoor afwijkend van normaal!
Intraveneuze infusie van amiodaron kan tromboflebitis veroorzaken: toediening dient plaats te vinden via een centrale lijn.
Amiodaron moet onder bewaking van hemodynamische parameters worden toegediend.

Acute reacties

Overgevoelighedsreacties als blozen, transpireren, hypotensie, shock.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, maagdarmklachten

Bereiden

Oplaaddosis: voeg 2 ampullen amiodaron 150 mg = 3 ml toe aan 44 ml **glucose 5%**; de eindconcentratie is 6 mg/ml, 50 ml

Onderhoudsdosis: naargelang de dosis: voeg 2 ampullen amiodaron 150 mg = 3 ml toe aan 44 ml **glucose 5%**; de eindconcentratie is 6 mg/ml, 50 ml.

Of voeg 3 ampullen amiodaron 150 mg = 3 ml toe aan 41 ml **glucose 5%**; de eindconcentratie is 9 mg/ml, 50 ml enz...

Let wel: de stabiliteit is maar 12 uur gegarandeerd. Amiodarone moet via een centrale lijn gegeven worden en via een volumetrische pomp.

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: **12 uur bij 20 °C, buiten de invloed van licht bewaren.**