



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

ATC: C01DX12
CNK: 0444-109

CORVATON® 20 mg/10 ml

Stofnaam	Molsidomine
Klasse	Cardiovasculair stelsel – Angina Pectoris
Farmaceutische vorm	Concentraat voor oplossing voor infusie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NaCl 0,9% OF glucose 5%

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus onverdund (bolusinjectie van 4 mg bij start therapie)
- IV perfusie Continu infuus

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	Kamertemperatuur (< 25°C)
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	24u op kamertemperatuur beschermd tegen licht

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen NaCl 0,9%, glucose 5%, glucose 10%

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden - Toediening vindt plaats onder continu hemodynamisch toezicht.



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

ATC: C01DX12
CNK: 0444-109

Bronnen

1. SKP Corvaton® (01/2015)

(10/07/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.