

GANCICLOVIR

(CYMEVENE[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 500 mg ganciclovir (als natriumzout) poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties

Bereiden

Los 500 mg ganciclovir op in 10 ml water voor injecties. De concentratie is 50 mg/ml.

Toedienen

Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in 1 uur, de toedieningssnelheid is maximaal 10 mg/minuut

Code voor toedienen

Categorie B

Houdbaarheid

Onverdund en na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: allopurinol, enalapriilaat, filgastrim, fluconazol

Onverenigbaar met

Aztreonam, foscarnet, ondansetron

Bijzonderheden

- De pH van de oplossing is 9-11
- Vermijd contact met huid en slijmvliezen. Indien dit toch gebeurt, grondig met water en zeep reinigen.
- Controle van het bloedbeeld wordt aanbevolen.

Acute reacties

Pijnlijkheid op injectieplaats, rash, urticaria, koorts.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, neutropenie, trombocytopenie, convulsies, verwardheid, hoofdpijn, maagarmstoornissen, oedeem, visusstoornissen, dyspnoe.