

CLINDAMYCINE

(DALACIN C[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 300 mg = 2 ml en 600 mg = 4 ml (150 mg/ml) clindamycine (als diwaterstoffosfaat)

Toedienen

Intramusculair: diep spuiten

Intraveneus als kortlopend infuus: 600 mg toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9% of glucose 5% (de concentratie is maximaal 12 mg/ml), in 20 minuten, de toedieningssnelheid is maximaal 30 mg/min.

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: aciclovir, amiodaron, ciclosporine, enalapriilaat, esmolol, fentanyl, foscarnet, labetalol, morfine, ondansetron, pethidine, zidovudine

Infuus: aminoglycosiden, aztreonam, benzylpenicilline, cefalotine, cefazoline, cefotaxim, cefpirom, ceftazidim, ceftizoxim, cefuroxim, , cimetidine, fluconazol, kaliumchloride, heparine, hydrocortison, methylprednisolon, metoclopramide, metronidazol, natriumbicarbonaat, ofloxacin, piperacilline, verapamil

Onverenigbaar met

Y-site: ampicilline, barbituraten, calciumgluconaat, fenytoïne, filgastrim, fluconazol, magnesiumsulfaat, theofylline

Infuus: ceftriaxon, ciprofloxacine

Bijzonderheden

Bevat benzylalcohol

Intramusculaire toediening van meer dan 600 mg wordt niet aanbevolen.

Intraveneuze toediening van meer dan 1200 mg in 1 uur wordt niet aanbevolen.

Toedienen van clindamycine d.m.v. continue infusie is beschreven.

Acute reacties

Ten gevolge van i.m. toediening: pijnlijkheid op injectieplaats. Rash, urticaria, pruritus. Zelden: angio-oedeem, anafylactische reacties, erythema multiforme.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, diarree, buikpijn, misselijkheid, braken, pseudomembraneuze colitis, huiduitslag, leverfunctiestoornissen, bloedbeeldafwijkingen. Ten gevolge van te snelle toediening: hypotensie, hartstilstand