

DALACIN C® 300 mg/2 ml

Stofnaam	Clindamycine fosfaat
Klasse	Infecties - Antibacteriële middelen - Clindamycine en lincomycine
Farmaceutische vorm	Oplossing voor injectie of infusie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM onverdund
- IV bolus NVT
- IV perfusie 50 ml NaCl 0,9% OF 50 ml glucose 5%
(max. concentratie: 18 mg/ml)

Toedienen

- SC NVT
- IM enkel aangewezen indien IV perfusie niet mogelijk is
- IV bolus NVT
- IV perfusie
 - Intermittente infusie over 10 min. (snelheid ≤ 30 mg/min)
 - Continue infusie aan infusiesnelheid van 0,75 – 1,25 mg/min

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	beneden 25°C
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	24 u in koelkast (2 – 8°C)

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen	glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in NaCl 0,45%, Ringerlactaat, glucose 5% in Ringer
----------------------------	--

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

- Bevat benzylalcohol.
- Intermittente IV-infusie van meer dan 1200 mg clindamycinefosfaat in 1 uur wordt niet aanbevolen. Als alternatief kan het geneesmiddel als een continue infusie worden toegediend.
- Intramusculaire toediening van meer dan 600 mg wordt niet aanbevolen.
- pH = 5,5 – 7

Bronnen

1. SKP Dalacin C® (02/2016)
2. Handbook on Injectable Drugs (online, 02/05/2017)
3. Injectable Drugs Guide (2011)
4. Uptodate (online, 02/05/2017)

(2/5/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.