

DANTROLEEN

(DANTRIUM I.V.®)

Afleveringsvorm

Flacon met 20 mg dantroleennatrium poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties

Bereiden

Los 20 mg dantroleen op in 60 ml water voor injecties. De concentratie is 0,333 mg/ml. Bescherm de oplossing direct tegen de invloed van licht.

Toedienen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 1-2 minuten
Intraveneus als kortlopend infuus: onverdund

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na oplossen: 6 uur bij 20 °C, buiten invloed van licht.

Onverenigbaar met

NaCl 0,9%, glucose 5%

Bijzonderheden

Er dient rekening mee te worden gehouden dat bij behandeling van één volwassen patiënt in totaal 200 mg nodig kan zijn.

Vaak dient een grote hoeveelheid water te worden toegediend (60 ml per flacon). Het preparaat bevat daarom tevens het diureticum mannitol (3 g per flacon) om volume overload tegen te gaan.

Voor dosering: zie ook protocol "maligne hyperthermie".

Acute reacties

Rash, urticaria

Bijwerkingen

Spierzwakte, duizeligheid, misselijkheid, diarree, tromboflebitis.

