

DEXAMETHASON

(DECADRON[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 4 mg = 1 ml (4 mg/ml, DECADRON[®]) dexamethason (als dinatriumfosfaat)

Toedienen

volwassen:

Intramusculair: onverdund 4 mg/ml

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 2-3 minuten

Intraveneus als infuus: toegevoegd aan 50-500 ml NaCl 0,9% of glucose 5%

Intra-articulair: onverdund

Intrabursaal: onverdund

kind:

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 1-5 minuten

Intraveneus als infuus: aangevuld met NaCl 0,9% of glucose 5% tot 10 ml, in 15 minuten

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, glucose 10%, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: aciclovir, allopurinol, cisplatin, cyclofosfamide, cytarabine, doxorubicine, filgastrim, fluconazol, fludarabine, foscarnet, heparine, kaliumchloride, methotrexaat, morfine, pethidine, piperacilline, zidovudine

Infuus: amikacine, cefazoline, cimetidine, famotidine, fentanyl, furosemide, lidocaine, metoclopramide, netilmycine, ondansetron, ranitidine, theofylline, verapamil

Onverenigbaar met

Y-site: ciprofloxacin, midazolam,

Infuus: diazepam, doxapram, fenobarbital, promethazine, vancomycine

Bijzonderheden

Bevat natriumpyrosulfiet. Deze stof kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken.

4 mg dexamethason komt overeen met 5,2 mg dexamethasondinatriumfosfaat

5 mg dexamethasondinatriumfosfaat komt overeen met 4,5 mg dexamethasonfosfaat

Acute reacties

Urticaria.

Bijwerkingen

Vochtretentie, duizeligheid, misselijkheid, stemmingsveranderingen.