

TRIPTORELINE

(DECAPEPTYL, DECAPEPTYL-CR[®])

Afleveringsvorm

Flacons met 0,1 mg = 1 ml (0,1 mg/ml) triptoreline-acetaat

Flacon met 3,75 mg triptoreline (als acetaat, in microcapsules) poeder voor injectievloeistof (DECAPEPTYL-CR 3,75[®])

Oplosmiddel

Suspendeervloeistof (bijgeleverd)

Bereiden

DECAPEPTYL 0.1mg: suspendeer 0.1mg met 1ml suspendeervloeistof. De concentratie is 0.1

mg/ml.

DECAPEPTYL-CR 3,75[®]: suspendeer 3,75 mg microcapsules met triptoreline in 2 ml suspendeervloeistof. De concentratie is 1,88 mg/ml.

Toedienen

- Subcutaan: onverdund, 0,1 mg/ml
- Intramusculair: onverdund, 1,88 mg/ml

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Direct na bereiden toedienen.

Bijzonderheden

- De microcapsules met triptoreline bewerkstelligen een vertraagde afgifte.
- De suspendeervloeistof bevat polysorbaat en carboxymethylcellulose.

Bijwerkingen

Pijnlijkheid op injectieplaats, opvliegers, verminderd libido, impotentie, gynaecomastie, testisatrofie, hypertensie, transpireren, atrofie vaginaslijmvlies, doorbraakbloedingen, hoofdpijn, vermoeidheid, slaapstoornissen. Ten gevolge van langdurig gebruik: osteoporose