

DROPERIDOL

(DEHYDROBENZPERIDOL[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 5 mg = 2 ml (2,5 mg/ml) droperidol
Flacon met 25 mg = 10 ml (2,5 mg/ml) droperidol

Toedienen

De bijsluiter vermeldt enkel intramusculaire toediening.
Intramusculair: onverdund
Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 1-2 minuten
Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 20 microg/ml (19)
Intraveneus als langlopend infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5% (19)

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C, buiten invloed van licht bewaren.

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: filgastrim, fluconazol, hydrocortison, kaliumchloride, ondansetron, pethidine
Infuus: atropine, buprenorfine, chloorpromazine, cimetidine, fentanyl, metoclopramide, midazolam, morfine, pentazocine, promethazine, scopolamine

Onverenigbaar met

Y-site: allopurinol, barbituraten, folinezuur, foscarnet, furosemide, heparine, piperacilline
Infuus: pentobarbital

Bijzonderheden

Toediening intraveneus als langlopend infuus is uitzondering: alleen bij hoog-risico patiënten.

Acute reacties

Zelden rash, exantheem, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Extrapiramidale bijwerkingen: dyskinesie, acathisie. Orthostatische hypotensie, sufheid, misselijkheid, braken, obstipatie