

VALPROÏNEZUUR

(DEPAKINE®)

Afleveringsvorm

Flacon met 400 mg natriumvalproaat poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties (bijgeleverd)

Bereiden

Los 400 mg valproïnezuur op in 4 ml water voor injecties. De concentratie is 100 mg/ml.

Toedienen

- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 3-5 minuten.
- Intraveneus als infuus: toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%.

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

Bijzonderheden

- Valproïnezuur mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen over één lijn toegediend worden.
- De pH van de oplossing is ongeveer 7
- Bevat 6 mmol natrium per 1000 mg

Bijwerkingen

Leverfunctiestoornissen, misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, tremor, slaperigheid, stupor en gedragsstoornissen, milde, reversibele beenmergdepressie