

## DEPAKINE® 400 mg + 4 ml solv.

<b>Stofnaam</b>	natriumvalproaat
<b>Klasse</b>	Anti-epileptica – Anti-epileptica met breed spectrum - Valproïnezuur en valproaat
<b>Farmaceutische vorm</b>	Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie.

### Bereiden

#### Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus 4 ml bijgeleverd oplosmiddel (water voor injectie)
- IV perfusie 4 ml bijgeleverd oplosmiddel (water voor injectie)

#### Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NaCl 0,9% OF glucose 5%

### Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus over 3 – 5 min. (10 mg/kg)
- IV perfusie over 24 uur (max. 2500 mg per dag)

### Houdbaarheid/Bewaarcondities

<b>Product</b>	beneden 25°C
<b>Na oplossen</b>	max. 24 uur in koelkast (2 – 8°C)
<b>Na verdunnen</b>	geen gegevens

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

**Verenigbare infusen** NaCl 0,9%, glucose 5%, Ringerlactaat

### Onverenigbare infusen

**Bijzonderheden** - pH = 7,6



Vlaamse Vereniging van  
Ziekenhuisapothekers

ATC: N03AG01  
CNK: 1085-380

## Bronnen

1. SKP Depakine® (02/2017)
2. Handbook on Injectable Drugs (online, 30/03/2017)

(30/03/2017)

---

### DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.