

# DEFEROXAMINE

(DESFERAL<sup>®</sup>)

## Afleveringsvorm

Flacon met 500 mg deferoxamine-mesilaat poeder voor injectievloeistof

## Oplosmiddel

Water voor injecties

## Bereiden

	flacon (mg)	toevoegen water (ml)	mg/ml
I.M./S.C.	500	2	250
Infusie	500	5	100

Voor het bereiden van de basisoplossing geen NaCl 0,9% gebruiken.

## Toedienen

### volwassen:

Subcutaan als langlopend infuus: onverdund of toegevoegd aan 50 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, de toedieningssnelheid is 20-40 mg/kg per 8-24 uur.

Intramusculair: onverdund

Intraveneus als langlopend infuus: onverdund of toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, de toedieningssnelheid is maximaal 15 mg/kg/uur.

### kind:

Intraveneus als langlopend infuus: toegevoegd aan 50 ml NaCl 0,9% of glucose 5% in 12-24 uur. De maximale toedieningssnelheid is 15 mg/kg/uur.

## Code voor toedienen

Categorie A en B

## Houdbaarheid

Onverdund en na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

## Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

## Onverenigbaar met

Heparine

## **Bijzonderheden**

In sommige gevallen is het mogelijk om een grotere ijzeruitscheiding te krijgen, door de dagelijkse dosis per infuus in 24 uur i.p.v. in 12 uur toe te dienen.

## **Acute reacties**

Irritatie op injectieplaats. Intramusculaire toediening is pijnlijk. Allergische en anafylactische reacties.

Ten gevolge van te snelle intraveneuze injectie: hypotensie.

## **Bijwerkingen**

Maagdarmstoornissen, aritmieën, duizeligheid, convulsies. Bij langdurige behandeling: gezichts- en gehoorsstoornissen, met name door te hoge doseringen.