

Prednisolon

(Di-Adreson-F-Aquosum®, DAF)

Afleveringsvorm

Ampul met 25 mg = 1 ml (25 mg/ml) en 25 mg = 2 ml (12,5 mg/ml) prednisolon (als dinatriumfosfaat)
Flacon met 25 mg prednisolonnatriumsuccinaat poeder voor injectievloeistof + 1 ml solvens (Di-Adreson-F-Aquosum®)

Oplosmiddel

Water voor injecties (bijgeleverd)

Bereiden

Flacon, poeder voor injectievloeistof: los 25 mg prednisolon op in 1 ml oplosmiddel. De concentratie is 25 mg/ml.

Toedieningsroute

Volwassenen
Intramusculair: onverdund
Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, de toedieningsnelheid is 25 mg/minuut
Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 50–100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in tenminste 20 minuten
Intraveneus als langlopend infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%
Intra-/peri-articulair: onverdund

Kinderen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, langzaam
Intraveneus als kortlopend infuus: verdund met NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 1 mg/ml, in 30 minuten

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4°C of 20°C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site : kaliumchloride
Infuus : aminofylline (ref. 23), benzylpenicilline, heparine, mannitol, prethcamide (ref. 23)

Onverenigbaar met

Calciumzouten

Acute reacties

Roodheid en pijnlijkheid op injectieplaats.

Bijwerkingen

Vochtretentie, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierzwakte.