

Acetazolamide

(Diamox[®])

Afleveringsvorm

Poeder voor reconstitutie (flacon met 500 mg)

Tabletten (250 mg)

Bereiden

Verdun het poeder voor gebruik met tenminste 5 ml water voor injectie. Men bekomt dan een oplossing van 100 mg/ml (geconcentreerder gebruik mag niet).

Doorverdunnen kan wel in glucose 5% of fysiologisch (stabiliteiten zijn beschreven b.v. 375 mg/1000 ml glu 5% of fys of 500 mg/100ml glu5%; Trissle 13th Ed)

Toedienen

Bij voorkeur intraveneuze toediening, mogelijkheid van intramusculaire toediening maar pijnlijk en bijgevolg niet aanbevolen. Toedienen over minimum 1 minuut.

Kortlopend infuus over 15-30 minuten (intensieve zorgen fiche 5/06/09).

Een dagdosis van 1.5 g mag niet overschreden worden

Houdbaarheid

De originele verpakking bewaren bij kamertemperatuur (15 tot 25°C).

De bereide oplossing kan bewaard worden gedurende zeker 48 uur in de koelkast (2 tot 8°C) of gedurende 12 uur bij kamertemperatuur.

Onverenigbaarheden

Y-site: diltiazem, TPN en multivitaminen

Bijwerkingen

- Anafylaxis
- gastro-intestinale ongemakken
- centraal: convulsies, depressie van het CZS
- dermatologisch: fotosensitiviteit, Stevens-Johnson syndroom,
- genito-urinair: hematurie, nierfalen
- bloedbeeldstoornissen
- leverstoornissen en abnormale lever functie testen

Acute reacties

Anafalaxie

Bij overdosis ziet men ernstige leverinsufficiëntie, hypovolemie en acidose.

Maagspoeling kan nodig zijn.

Bron

Wetenschappelijke bijsluiter 1997; UpToDate; Clinical Pharmacology, Trissle
13Ed 23/06/2009