

ACTAZOLAMIDE

(DIAMOX[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 500 mg acetazolamide (als natriumzout) poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties

Bereiden

Los 500 mg acetazolamide op in 5 ml water voor injecties. De concentratie is 100 mg/ml.

Toedienen

volwassen:

- Intramusculair: onverdund
- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, de toedieningssnelheid is maximaal 200 mg/min
- Intraveneus als kortlopend infuus: 500 mg toegevoegd aan 100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in 15-30 minuten.

kind:

- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, de toedieningssnelheid is maximaal 100 mg/min (17)
- Intraveneus als kortlopend infuus: verdund met NaCl 0,9% of glucose 5% tot een maximale concentratie van 50 mg/ml in 30 minuten (maximale concentratie bij vochtbeperking is 100 mg/ml).

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Onverdund en na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C.

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Cimetidine, kaliumchloride, ranitidine

Bijzonderheden

- Intramusculaire toediening is pijnlijk. Intraveneuze toediening heeft de voorkeur.

- De pH van de oplossing is ongeveer 9,2.
- Bevat 4,2 mmol natrium per 1000 mg.

Acute reacties

Rash, urticaria, koorts

Bijwerkingen

Moeheid, verwardheid, tintelingen in tenen en vingers, verminderde eetlust, gehoorstoornissen