

FLUCONAZOL

(DIFLUCAN[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 200 mg = 100 ml (2 mg/ml) fluconazol

Toedienen

volwassen:

Intraveneus als kortlopend infuus: onverdund, in tenminste 5 minuten, de toedieningssnelheid is maximaal 20 mg/ minuut)

kind:

Intraveneus als kortlopend infuus: onverdund, in 30 minuten

Code voor toedienen

Categorie B

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking. Na aanprikken 24 uur bij 20 °C.

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: allopurinol, aztreonam, benzylpenicilline, chloorpromazine, cimitidine, dexamethason, droperidol, fenytoïne, filgastrim, folinezuur, foscarnet, ganciclovir, hydrocortison, metoprolol, clopramide, midazolam, morfine, ondansetron, pethidine, promethazine, tobramycine, vancomycine, zidovudine

Infuus: aciclovir, amikacine, gentamicine, heparine, kaliumchloride, metronidazol, morfine, theofylline

Onverenigbaar met

Amfotericine, ampicilline, calciumgluconaat, cefalosporinen, chlooramfenicol, clindamycine, co-trimoxazol, diazepam, digoxine, erythromycine, furosemide, haloperidol, imipenem, pentamidine, piperacilline, ticarcilline

Bijzonderheden

- Fluconazol kan zo nodig verdund worden.
- Bevat 7,5 mmol natrium per flacon.

Acute reacties

Zelden: anafylactische shock

Bijwerkingen

Misselijkheid, buikpijn, diarree, hoofdpijn, huiduitslag