



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

ATC: J02AC01
CNK: 2409-787

DIFLUCAN® 400 mg/200 ml

Stofnaam	fluconazol
Klasse	Infecties – Antimycotica – Azoolderivaten - Fluconazol
Farmaceutische vorm	Oplossing voor infusie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie onverdund

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie Maximum toedieningsnelheid: 10 ml/min

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	Kamertemperatuur (< 30°C), niet in de vriezer bewaren
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	24u bij 2-8°C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen NaCl 0,9%, glucose 5%, glucose 20%, Ringer, Hartmann, Natriumbicarbonaatoplossing 4,2%, Natriumbicarbonaat 5%, kaliumchloride oplossing in glucose

Onverenigbare infusen Alle andere infuusoplossingen die hierboven niet vermeld worden



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

ATC: J02AC01
CNK: 2409-787

Bijzonderheden

- Bij IV/PO-switch moet de dosis niet aangepast worden.
- pH = 4 – 8
- Osmolariteit: iso-osmotisch (300 à 315 mOsm/l)
- Flacon bevat 15 mmol Na⁺ en 15 mmol Cl⁻.
Toedieningssnelheid aanpassen bij zoutrestrictie.

Bronnen

1. SKP Diflucan (12/2016)
2. Handbook on injectable drugs (online)

(18/10/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.