



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

ATC: H02AB01
CNK: 3370-244

DIPROPHOS® 10 mg + 4 mg/2 ml

Stofnaam betamethason dipropionaat + betamethason natriumfosfaat

Klasse Hormonaal stelsel – Corticosteroiden

Farmaceutische vorm Suspensie voor injectie met verlengde afgifte in ampul.
Voor intramusculair, intradermaal, intra-articulair, intralaesionaal, intrabursaal en peri-articulair gebruik.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM onverdund
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Toedienen

- SC NVT
- IM diepe intramusculaire injectie in de bil
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Houdbaarheid/Bewaarcondities

- Product** Bewaren bij een temperatuur van maximum 25 °C
- Na oplossen** NVT
- Na verdunnen** NVT

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

- Diprophos mag NIET intraveneus of subcutaan worden toegediend.
- Indien gelijktijdig toedienen van een lokaal anestheticum gewenst is, kan Diprophos gemengd worden met 1 of 2 % Lidocaine hydrochloride. De dosis diprophos wordt eerst opgetrokken, vervolgens de dosis lidocaine en de spuit kort geschud.
- Bij herhaalde intra-artriculaire injecties kunnen gewrichtsletsels optreden. Er bestaat een risico op besmetting.

Bronnen

1. SKP Diprophos® (10/2017)

(16/01/2018)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.