

INSULINE, SUBCUTAAN

(DIVERSE INSULINEPREPARATEN)

Afleveringsvorm

Diverse insulinepreparaten: o.a. Actrapid, Humuline, Insulatard, Mixtard, Monotard, Ultratard.
Er
zijn gewone ampullen, ampullen voor gebruik in insulinepen en voorgevulde
wegwerppennen
verkrijgbaar.

Toedienen

Subcutaan: onverdund

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking.
Na aanprikken ampullen/pensystemen: 1 maand bij 20 °C, buiten invloed van licht bewaren.

Bijzonderheden

Actrapid[®], Humuline regular[®] en Velosulin[®] bevatten gewone insuline.
Humuline comb.[®] en Mixtard[®] bevatten combinaties van gewone en isofane insuline.
Humuline NPH[®], Insulatard[®] bevatten isofane insuline.
Ultratard[®] bevat kristallijne zinkinsuline; Monotard[®] bevat een combinatie van amorfe en
kristallijne
zinkinsuline.
Dien insuline een half uur voor de maaltijd toe.
Kies voor één toedieningsplaats om verandering in absorptie te voorkomen, d.w.z. kies voor
de
bovenarm, het bovenbeen of de buik en houdt deze toedieningsplaats aan.
Vermeld na het aanbreken, gereedmaken of aanprikken altijd het tijdstip en de datum.
Verwijder na injectie altijd de naald van de pen om lekken en daarmee concentratiewisseling
te
voorkomen.

Acute reacties

Zelden: urticaria, misselijkheid, braken, angio-oedeem, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Hypoglycemie, erytheem, lipodystrofie, insulineresistentie.