

ECALTA (ANIDULAFUNGIN) 100 MG flacon IV

ECALTA flacons worden in de koelkast bewaard.

DOSERING

Dag 1:

Oplaaddosis 200 MG in 200 ML NaCl 0.9% of glucose 5% oplossing toedienen over 3 uur

Dag 2 en volgende:

Onderhoudsdosis 100 MG in 100 ML NaCl 0.9% of glucose 5% oplossing over 1,5 uur

OPLOSSEN EN TOEDIENEN

- ECALTA 100 MG IV oplossen met 30 ML water voor injectie. De reconstitutie-tijd is maximaal 5 minuten. De opgeloste vial moet binnen het uur worden toegediend aan NaCl 0.9% of glucose 5%.
 - oplaaddosis (200 MG)
 - Twee vials, volledig opgelost, toevoegen aan 200 ML NaCl 0.9% of glucose 5%
 - onderhoudsdosis (100 MG)
 - Eén vial, volledig opgelost, toevoegen aan 100 ML NaCl 0.9% of glucose 5%

VERENIGBAARHEID

Ecalta is niet verenigbaar met andere geneesmiddelen

STABILITEIT

Na oplossen met water voor injectie 1 uur bij 5°C

Na doorverdunnen in NaCl 0.9% of glucose 5% oplossing 24 u bij 5°C.