



Vlaamse Vereniging van  
Ziekenhuisapothekers

ATC: J02AX06  
CNK: 2455-343

## ECALTA® 100 mg

<b>Stofnaam</b>	anidulafungine
<b>Klasse</b>	Infecties – Antimycotica – Echinocandinen
<b>Farmaceutische vorm</b>	Poeder voor concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie.

### Bereiden

#### Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 30 ml water voor injectie (conc = 3,33 mg/ml)

#### Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 100 mg anidulafungine toevoegen aan 100 ml NaCl 0,9% OF 100 ml glucose 5% (conc. = 0,77 mg/ml)  
200 mg anidulafungine toevoegen aan 200 ml NaCl 0,9% OF 200 ml Glucose 5% (conc. 0,77 mg/ml)

### Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 100 mg over minimaal 90 min. (1,4 ml/min, 1,1mg/min)  
200 mg over minimaal 180 min. (1,4ml/min, 1,1 mg/min)

### Houdbaarheid/Bewaarcondities

<b>Product</b>	koelkast (2 – 8°C), niet invriezen
<b>Na oplossen</b>	24u op kamertemperatuur (< 25°C)
<b>Na verdunnen</b>	48u op kamertemperatuur, 72u in diepvries

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

**Verenigbare infusen** NaCl 0,9%, glucose 5%



Vlaamse Vereniging van  
Ziekenhuisapothekers

ATC: J02AX06  
CNK: 2455-343

**Onverenigbare infusen**    Natriumbicarbonaat

**Bijzonderheden**            -    pH = 3,5 – 5,5

**Bronnen**

1. SKP Ecalta® (10/07/2017)
2. Handbook on injectable drugs (10/07/2017)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(10/07/2017)

---

**DISCLAIMER**

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.