

# EFEDRINE

## (EFEDRINE)

### Afleveringsvorm

Ampul met 50 mg = 1 ml (50 mg/ml) efedrine-hydrochloride

### Toedienen

Subcutaan: onverdund

Intramusculair: onverdund

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, maximaal 150 mg, de toedieningssnelheid is maximaal 5 mg per minuut

Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in 30 minuten

### Code voor toedienen

Categorie A en B

### Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C.

### Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

### Onverenigbaar met

Infuus: fenobarbital, thiopental

### Bijzonderheden

De maximale dagdosering bij volwassenen is 150 mg. Bij herhaalde toediening neemt het effect als regel af.

### Acute reacties

Ten gevolge van te snelle intraveneuze toediening: verhoogde bloeddruk, hartritmestoornissen.

### Bijwerkingen

Tremor, slapeloosheid, angst, tachycardie, hypertensie, hoofdpijn, misselijkheid, transpireren