

EPHEDRINE.HCL Sterop® 50 mg/1 ml

Stofnaam	efedrine, hydrochloride
Klasse	Cardiovasculair stelsel – Hypotensie – Middelen bij acute hypotensie
Farmaceutische vorm	Oplossing voor injectie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Toedienen

- SC 25 – 50 mg
Indien nodig te herhalen met een max. dosis van 150 mg per 24 uur.
- IM 25 – 50 mg
Indien nodig te herhalen met een max. dosis van 150 mg per 24 uur.
- IV bolus 10 tot 25 mg via langzamen injectie. Indien nodig te herhalen na 10 min. met een maximale dosis van 150 mg per 24 uur.
- IV perfusie NVT

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	na openen onmiddellijk gebruiken
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	NVT

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen NaCl 0,9%



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

ATC: C01CA26
CNK: 0298-810

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden - pH = 4,5 – 7,0

Bronnen

1. SKP Ephedrine.HCl Sterop® (05/2010)
2. Injectable Drugs Guide (2011)

(30/03/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.