

RUBELLAVACCIN

(ERVEVAX[®])

Afleveringsvorm

Ampul (+ wegwerpspuit) met 1000 CCID50 rubellavaccin poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Oplosmiddel (bijgeleverd)

Bereiden

Los 1000 CCID50 rubellavaccin op in 0,5 ml oplosmiddel. De concentratie is 2000 CCID50/ml. De oplossing is helder geel.

Toedienen

Subcutaan: onverdund, bij voorkeur lateraal in bovenarm

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking

Na oplossen: 8 uur bij 4 °C, buiten invloed van licht.

Bijzonderheden

- Rubellavaccin bevat een RA-27/3-stam.
- CCID50 = Cell culture infective dose 50%, de dosis die 50% van de celcultures kan infecteren.
- Bevat 25 mg neomycine.
- Lokale reacties zoals branderig gevoel op de injectieplaats kunnen voorkomen.

Acute reacties

Pijnlijkheid op injectieplaats, exantheem, urticaria, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Koorts, gewrichtspijn, misselijkheid, braken, diarree, hoofdpijn, duizeligheid, zere keel