

# **ROCURONIUM**

## **(ESMERON®)**

### **Afleveringsvorm**

Ampul met 50 mg = 5 ml rocuroniumbromide

### **Toedienen**

- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund
- Intraveneus als infuus: onverdund of toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%

### **Code voor toedienen**

Categorie A en B

### **Houdbaarheid**

Direct na aanprikkken toedienen.

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

### **Infuusvloeistoffen**

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

### **Verenigbaar met**

Adrenaline, alfentanil, amoxicilline, ceftazidim, cefuroxim, cimetidine, clonazepam, clonidine, dobutamine, dopamine, esmolol, fentanyl, gentamicine, heparine, isoprenaline, kaliumchloride, ketamine, labetalol, lidocaine, mannitol, metoclopramide, metoprolol, midazolam, milrinon, morfine, natriumbicarbonaat, nifedipine, nimodipine, nitroglycerine, nitroprusside, noradrenaline, pancuronium, pethidine, promethazine, ranitidine, sufentanil, suxamethonium, vecuronium, verapamil

### **Onverenigbaar met**

Amfotericine B, azathioprine, cefazoline, cloxacilline, dexamethason, diazepam, enoxamone, erythromycine, famotidine, furosemide, gallamine, hydrocortisonnatriumsuccinaat, insuline, intralipid, methohexital, methylprednisolon, prednisolonnatriumsuccinaat, thiopental, trimethoprim, vancomycine

## **Acute reacties**

Zelden: urticaria, anaфylactische reacties

## **Bijwerkingen**

Jeuk, erytheem op injectieplaats, bronchospasmen.