

NEXIAM

(esomeprazole)

Afleveringsvorm

Comprimés van 20 mg esomeprazole (als magnesiumtrihydraat).
Flacons met 40 mg esomeprazole voor intraveneuze toediening.

Bereiden en toedienen

Voor toediening via nasogastrische sonde (diameter > 1.7 mm of Ch8)

1. Plaats de tablet in een spuit van 25-50 ml.
2. De spuit met ong. 25 ml water en 5 ml lucht vullen. Schudden tot de tablet is opgelost.
3. De spuit met de punt omhoog houden en nagaan of de punt niet verstopt is.
4. Bevestig de spuit op de sonde terwijl de omhooghoud-positie behouden blijft.
5. Schudden met de spuit en ze met de punt naar beneden houden. Injecteer onmiddellijk 5-10 ml in de sonde. De spuit terugdraaien na injectie en schudden. Keer de spuit opnieuw om en injecteer opnieuw 5-10 ml in de sonde. Deze procedure herhalen tot de spuit leeg is.
6. De spuit opnieuw vullen met ong. 25 ml water en 5 ml lucht en stap 5 herhalen.

Voor toediening via intraveneuze injectie

1. 5 ml van een NaCl 0.9% oplossing toevoegen aan de flacon.
2. Na reconstitutie moet de oplossing als een intraveneuze injectie worden toegediend over een periode van minstens 3 minuten. Ongebruikte oplossing werpt men weg.

Voor toediening via intraveneus kortlopend infuus

1. De flacon oplossen in maximum 100 ml natriumchloride (0.9%) oplossing.
2. De oplossing moet na reconstitutie als een intraveneuze infusie over een periode van 10 tot 30 minuten toegediend worden. De ongebruikte oplossing moet worden weggeworpen.
3. **Voor een continu infuus over 72u, post-bolus (win voor de dosis een advies in van een gastro-enteroloog) dient de oplossing na 12 uur vervangen te worden.**

Houdbaarheid

Altijd onmiddellijk na reconstitutie te gebruiken. Er werd chemische en fysische stabiliteit tijdens het gebruik aangetoond gedurende 12 uur bij 25°C. Vanuit microbiologisch standpunt moet het geneesmiddel onmiddellijk worden gebruikt.

Beschermen tegen licht tot aan de toediening, de toediening zelf niet nodig. Bescherm de niet gebruikte flacons ALTIJD van licht door ze in de originele kartons te bewaren; eens uit de kartonnen verpakking zijn de niet aangeprikte flacons 24 uur houdbaar (Compendium 16/06/2009).

Infuusvloeistoffen

Zoals hierboven beschreven.

Opgemaakt 29/04/2005, bron firma